**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anatomi Anabilim Dalı**

**CURCUMIN'İN EHRlich ASSİT VE SOLİD TÜMÖR
OLUŞTURULAN FARELERDE ANTİTÜMÖRAL ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI**

**Hazırlayan
Seher YILMAZ**

**Danışman
Prof. Dr. Harun ÜLGER**

Doktora Tezi

**MART 2016
KAYSERİ**

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anatomi Anabilim Dalı**

**CURCUMIN'İN EHRlich ASSİT VE SOLİD TÜMÖR
OLUŞTURULAN FARELERDE ANTİTÜMÖRAL ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI**

Doktora Tezi

**Hazırlayan
Seher YILMAZ**

**Danışman
Prof. Dr. Harun ÜLGER**

**Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
tarafından TDK-2014-5239 kodlu proje ile desteklenmiştir.**

**MART 2016
KAYSERİ**

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

Bu alıřmadaki tm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir řekilde elde edildiđini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranıřların gerektirdiđi gibi, bu alıřmanın znde olmayan tm materyal ve sonuları tam olarak aktardıđımı ve referans gsterdiđimi belirtirim.

Seher YILMAZ

İmza

YÖNERGEYE UYGUNLUK ONAYI

“Curcumin’in Ehrlich assit ve solid tümör oluşturulan farelerde antitümöral etkisinin araştırılması”. İsimli Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Tezi Hazırlayan

Seher YILMAZ

Danışman

Prof. Dr. Harun ÜLGER

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erdoğan UNUR

ONAY

Prof.Dr. Harun ÜLGER danışmanlığında Seher YILMAZ tarafından “Curcumin’in Ehrlich Assit ve Solid Tümör Oluşturulan Farelerde Antitümöral Etkisinin Araştırılması” adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı Doktorac tezi olarak kabul edilmiştir.

24.03./2016

JÜRİ**İmza**

Üye:

Prof. Dr. Mehmet ÇİMEN (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD).....

Danışman:

Prof. Dr. Harun ÜLGER (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD).....

Üye:

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER (Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi AD).....

Üye:

Doç. Dr. Tolga ERTEKİN (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD).....

Üye: Yrd. Doç. Dr. İlhan OTAĞ (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu).....

ONAY:

Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun 31.03./2016 tarih ve 724. sayılı kararı ile onaylanmıştır.

31.03./2016

A. Özdarendeli
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ

TEŞEKKÜR

Tez konumun seçilmesi ve planlanmasındaki katkılarından dolayı bir dönem danışmanlığımı yapan Doç.Dr Niyazi ACER'e, tezimin yürütülmesinde bana destek olan, bilgisini ve yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Harun ÜLGER'e, doktora eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım Prof. Dr. Kenan AYCAN ve Prof. Dr. Erdoğan UNUR'a, gerek ders ve gerekse tez döneminin deneysel aşamasında ve sonrasında bilgi ve deneyimlerini benden esirgemeyen hocalarım Doç. Dr. Tolga ERTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Mehtap NİSARİ ve Yrd. Doç. Dr Ayşe SAĞIROĞLU'na, Histoloji Embriyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Arzu YAY'a şükranlarımı sunarım.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimim boyunca ve bu çalışmayı yaparken benden katkısını esirgemeyen Anatomi ailesinden çok kıymetli arkadaşlarım Özlem BOZKURT, Şerife ÇINAR, Özge AL ve Hatice SUSAR'a, her konuda desteklerinden dolayı Anatomi Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ve Anatomi Anabilimdalı çalışanlarına, tezin deneysel aşamasında zaman zaman beraber çalıştığım arkadaşlarım Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencileri Emin KAYMAK ve Betül YALÇIN'a, hayvan teminindeki katkıları için DEKAM yöneticileri ve çalışanlarına, tez çalışmasına maddi destek veren Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne,

Ve özellikle her konuda desteğini ve emeğini benden esirgemeyen çok sevdiğim aileme sonsuz teşekkür ederim...

Seher YILMAZ

CURCUMIN'IN EHRlich ASSIT VE SOLİD TÜMÖR OLUŞTURULAN FARELERDE ANTİTÜMÖRAL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Seher YILMAZ

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Anabilimdalı Doktora Tezi
Mart 2016
Danışman: Prof.Dr. Harun ÜLGER

ÖZET

Curcumin, halk arasında yaygın olarak baharat, yiyecek renklendirici ve koruyucu olarak kullanılan sarı renkli bir bitkisel üründür. Curcumin anti-inflamatuvar, anti-kanserojen ve anti-oksidan özelliklerinden dolayı yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu çalışmada fare meme adenokarsinomundan kökenlenen ve Balb/C farelerde geliştirilen Ehrlich Assit Tümör modelinde farklı dozlarda curcumin uygulamasının assit ve solid tümör üzerine etkileri araştırıldı. Çalışmamızda 6 tanesi stok hayvan diğerleri assit ve solid tümör gruplarında olmak üzere toplam 86 adet Balb/C fare kullanıldı. Farelerin tamamına stok hayvandan alınan Ehrlich assit tümör (EAT) hücreleri (1×10^6 EAT hücresi) intraperitoneal ve subkutan yolla enjekte edildi. Assit tümör oluşturulan hayvanların tedavi gruplarına 10 gün boyunca, solid tümör oluşturulan grupların tedavi gruplarına ise 15 gün boyunca intraperitoneal olarak 25mg/kg ve 50mg/kg curcumin uygulandı. Deney süresince tüm grupların kilo değişimleri kaydedildi. 10. günde assit tümör oluşturulan hayvanların periton boşluğu içerisindeki EAT hücrelerinin bulunduğu assit sıvısı alınarak canlı ve ölü hücre sayımı yapılarak *in vivo* sitotoksitesi değerlendirildi. Deney sonunda hayvanlar dekapite edilip assit tümör oluşturulan gruplara ait hayvanların karaciğer, mide, dalak, böbrek, incebağırsak ve kalınbağırsak dokuları, solid tümör oluşturulan hayvanların ise tümör dokuları histopatolojik değerlendirme için alınarak tespit edildi. Solid tümör oluşturulan hayvanların tümör dokularının hacimleri ölçüldükten sonra kesitlerde immünohistokimyasal olarak Faktör VIII ekspresyonu ile angiogenesis, Tunel yöntemi ile de hücre Apoptozu belirlenerek gruplar arasındaki fark değerlendirildi. Ayrıca curcumin'in EAT hücreleri üzerindeki *in vitro* sitotoksik etkisinin belirlenebilmesi için curcumin ekstraktlarının 10, 20 ve 30 $\mu\text{g mL}^{-1}$ farklı konsantrasyonları uygulanarak canlı ve ölü hücre oranları farklı iki kişi tarafından sayılarak gruplar karşılaştırıldı. Assit tümör oluşturulan gruplardaki farelerin ağırlık artışına bakıldığında en fazla kilo artışının tümör kontrol grubundan sonra

25mg/kg curcumin verdiğimiz grupta ve daha sonra 50mg/kg curcumin uygulanan grupta olduğu gözlemlendi. Assit tümör oluşturulan hayvanların dokular histopatolojik sonuçları 50mg/kg curcumin uygulanan grupta tümör kontrol grubuna oranla alınan dokuların etrafında EAT hücrelerinin daha az olduğu gözlemlendi. Solid tümör oluşturulan hayvanlarda tümör hacim artışı kontrol grubuna (4603.99 mm³) oranla en az 25mg/kg curcumin uygulanan grupta gözlenmiştir (1179.56 mm³) (p<0.05). Deney sonunda 50mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda damar yoğunluğunun önemli derecede azaldığı (1.866) ve apoptotik hücre sayısının artmış olduğu gözlemlendi (7.775) (p<0.05). *In vitro* deney grubunda ise 10µg/ml curcumin uygulanan grupta 3 ve 24 saatlik inkübasyon sonrasında apoptoza uğramış hücre sayısı daha fazla olarak gözlemlendi. Sonuç olarak EAT hücreleri ile oluşturulan gerek assit tümör gelişimi gerekse solid tümör gelişimi üzerinde curcumin'in antitümöral etki gösterdiği birkez de bizim çalışmamızda gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ehrlich Assit Tümör, Curcumin, Apoptoz, Faktör 8

**THE RESEARCH OF THE ANTI-TUMORAL EFFECTS ON MICE FORMED
OF CURCUMIN'S EHRlich ASCITES AND SOLID TUMOR**

Seher YILMAZ

Erciyes University, Institute Of Medical Sciences

Department Of Anatomy

PhD Thesis, March 2016

Supervisor: Prof. Dr. Harun ÜLGER

ABSTRACT

Curcumin is an herbal product with yellow color used for seasoning, protection and coloring of foods in the public. It is widely used due to its anti-inflammatory, anti-tumor and anti-oxidant features. In this study, effects of curcumin administration at different doses on ascites and solid tumors were investigated in Ehrlich Ascites Tumor model in Balb/C mice originating from rat breast adenocarcinoma. Overall, 86 Balb-c mice (6 as stock animal) were used in this study. Ehrlich ascites tumor (EAT) cells (1×10^6 EAT cells) harvested from stock animals were injected to all rats via intraperitoneal and subcutaneous route. Doses of 25 mg/kg (i.p.) and 50 mg/kg were given over 10 days to the animals in the treatment groups in which ascites tumor was induced whereas over 15 days to the animals in the treatment groups in which solid tumor was induced. Throughout experiments, weight changes were recorded in all groups. On the day 10, in vivo cytotoxicity was assessed by counting alive and death cells in ascites fluid including EAT cells obtained from peritoneal space of animals in which ascites tumors were induced. All animals were decapitated at the end of experiment. The liver, stomach, spleen, kidney, small intestine and large intestine tissues from animals with ascites tumor and tumor tissues from animals with solid tumor were removed for histopathological examination. In animals with solid tumor, volume of tumor tissues was measured and angiogenesis and apoptosis were assessed by Factor VIII expression and Tunnel method using immunohistochemical staining in tumor tissues respectively. The differences in angiogenesis and apoptosis were assessed among all groups. In addition, in order to determine in vitro cytotoxic effects of curcumin on EAT cells, alive and death cell ratios were counted by 2 different observers after giving curcumin concentrations of 10, 20 and $30 \mu\text{g mL}^{-1}$. When rats in the groups with ascites tumor were assessed, maximum weight gain was observed in tumor control group; followed by the group received 25 mg/kg curcumin and the group received 50mg/kg curcumin. Histopathological examination in ascites tumor groups revealed that number of EAT

cells at surrounding tissues was smaller in the group received 50 mg/curcumin when compared to tumor control group. The lowest increase in tumor volume was observed in the group received 25mg/kg curcumin (1179.56 mm³) when compared to tumor control group (4603.99 mm³) (p<0.05). At the end of experiment, it was observed that vessel intensity (1.886) was significant decreased while number of apoptotic cells (7.775) was significantly increased in the group received 50mg/kg curcumin (p<0.05). In the in vitro experiment group, greater number of apoptotic cells was observed in the group received 10 µg/ml curcumin after 3 and 24 hours incubation. In conclusion, anti-tumor activity of curcumin in both ascites and solid tumor development induced by EAT cells was reproduced in this study.

Key words: Ehrlich Ascites Tumor, Curcumin, Apoptosis, Factor 8

İÇİNDEKİLER

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK.....	i
YÖNERGEYE UYGUNLUK ONAYI.....	ii
ONAY	iii
ONAY:	iii
TEŞEKKÜR	iv
ÖZET	v
ABSTRACT	vii
İÇİNDEKİLER.....	ix
KISALTMA VE SİMGELER	xii
TABLolar LİSTESİ.....	xiv
ŞEKİLLER VE RESİMLER LİSTESİ	xv
1.GİRİŞ ve AMAÇ	1
2.GENEL BİLGİLER	3
2.1 KANSER.....	3
2.1.1 Kanser ve ölüm oranları.....	4
2.1.2 Kanser ve tamamlayıcı Tıp:	4
2.2. TIPTA BİTKİ EKSTRELERİNİN KULLANIMI	5
2.3. CURCUMİN (TURMERIC)	6
2.3.1.Curcumin'in kimyasal özellikleri.....	6
2.3.2. Curcumin'in farmakokinetik özellikleri	7
2.3.3. Curcumin'in klinik özellikleri.....	8
2.3.4. Curcumin'in antikanserojen özellikleri	8
2.4. DENEYSEL KANSER MODELLERİ.....	9
2.4.1. Spontan veya transplante edilebilen tümör modelleri	9
2.4.2. Ehrlich Assit Tümörü (EAT)	10
2.4.3. Ehrlich Solid Tümörü	11
2.5.DENEYSEL ÇALIŞMALARDA KANSERLİ DOKULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	11
2.5.1. Apoptoz.....	11
2.5.1.1. Apoptoza giden hücrede morfolojik değişiklikler.....	13
2.5.1.2. Apoptozun aşamaları.....	14
2.5.1.3. Apoptozisin indüklenmesi	15

2.5.2. Tümör anjiogenezisi.....	16
2.5.2.1. Anjiogenezis basamakları	17
3. GEREÇ VE YÖNTEM	18
3.1. Araştırmada kullanılan denek cinsi, sayısı ve dağılımı	18
3.2. Deneysel prosedür	18
3.3.Stok farelerin oluşturulması	19
3.4. Hücre sayımı prosedürü	19
3.5. Curcumin ekstraktının çözünmesi ve sterilizasyonu	20
3.6. Deney gruplarının oluşturulması	20
3.7. Sıvı tümör grupları.....	20
3.7.1.Sıvı tümör oluşturulan deney gruplarında yapılan incelemeler	21
3.7.2. Histolojik doku takibi	21
3.8. Katı tümör grupları	22
3.9. İmmunohistokimyasal uygulama.....	23
3.9.1 Apoptozis tunel boyama metodu.....	23
3.9.2 Faktör 8 boyama.....	23
3.10 In vitro deney grubu.....	24
3.10.1 Hücre sayımı	25
3.11. Sonuçların değerlendirilmesi.....	25
4. BULGULAR	26
4.1. Deney süresince assit tümör gruplarının vücut ağırlık değişimleri	28
4.2. Histopatolojik bulgular	30
4.2.1. Böbrek dokusu.....	30
4.2.2 Karaciğer dokusu.....	33
4.2.3 Mide dokusu.....	35
4.2.4. Dalak dokusu.....	37
4.2.5. Kalın bağırsak dokusu	39
4.2.6. İnce bağırsak dokusu	40
4.3 Curcumin ekstraktının in vivo sitotoksitesi.....	42
4.4 Deney süresince solid tümör gruplarının vücut ağırlık değişimleri	43
4.4.1 Deney süresince solid tümör gruplarının tümör hacim Değişimler.....	45
4.5. Apoptotik bulgular.....	46
4.6.Anjiogenezis bulguları.....	47

4.7. EAT hücreleri üzerine uygulanan curcumin ekstraktının invitro etkisi.....	49
5. TARTIŞMA VE SONUÇ.....	52
6.KAYNAKLAR.....	61
EKLER	
ÖZGEÇMİŞ	

KISALTMA VE SİMGELER

<u>SEMBOL</u>	<u>ANLAMI</u>
µg	:Mikrogram
µM	:Mikromolar
µl	:Mikrolitre
µm	:Mikrometre
cm	:Santimetre
DAB	:Diaminobenzidin
DAPI	:4,6-diamidino-2-phenylindole
DEKAM	:Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
EAT	:Ehrlich assit tümörü
EAC	:Ehlich carcinoma cell
DMBA	:Dimethylbanz antthracene
MNNG	:N-methyl-N-nitro-N nitrosoguanidine
DMSO	:Dimethyl sülfoksit
SF	:Serum fizyolojik
H&E	:Hematoksilen eozin
FITC	:Floresan izotiyosiyanat
FVIII	:Faktör 8
H₂O₂	:Hidrojen peroksit
HUAEC	:İnsan umbilikal arter endotelyal hücresi
HUVEC	:İnsan umbilikal ven endotelyal hücresi
ml	:Mililitre
mm³	:Milimetreküp

nm	:Nanometre
PBS	:Phosphate buffer saline
PMA	:Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
RCC	:Renal clear cell carcinoma
VWF	:Von willenbrand faktör
W	:Watt
IC₅₀	:Maksimum inhibisyonun % 50'sini oluşturan ilaç konsantrasyonu
ip	:İntraperitoneal
iv	:İntravenöz
sc	:Subkutan

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 3.1.	Işık mikroskobu doku hazırlama tekniği	21
Tablo 3.2.	Hematoksilen-Eozin Boyama Tekniği.....	22
Tablo 4.1.	Kontrol ve tedavi grubuna ait farelerin vücut ağırlıklarının 1-10 gün aralığında değişimi.	28
Tablo 4.2.	Gruplar arasında birinci gün ile diğer günler arasındaki vücut ağırlıklarının ortalama değişimi	29
Tablo 4.3.	Deney gruplarında EAT hücrelerinin ortalama sayısı	42
Tablo 4.4.	Kontrol ve tedavi grubuna ait farelerin vücut ağırlıklarının 1-15 gün aralığında değişimi.	44
Tablo 4.5.	Gruplar arasında birinci gün ile diğer günler arasındaki vücut ağırlıklarının ortalama değişimi	45
Tablo 4.6.	Gruplar arası solid tümör hacimlerinin günlere göre karşılaştırılması	46
Tablo 4.7.	Gruplar arası apoptotik indeksin karşılaştırılması.....	46
Tablo 4.8.	Faktör VIII'in damar yoğunluğunun deney grupları arası karşılaştırılması	48
Tablo 4.9.	<i>In vitro</i> deney gruplarında hesaplanan ortalama canlı ve ölü hücre değerleri	51

ŞEKİLLER VE RESİMLER LİSTESİ

Şekil 2.1.	Normal ve kanser hücrelerinin görünümü.	5
Şekil 2.2.	Curcuma longa	6
Şekil 2.3.	Curcumin'in molekül yapısı.....	7
Şekil 2.4.	Apoptozis ve nekrozis.....	13
Şekil 2.5.	Apoptoza giden hücrede morfolojik değişiklikler	14
Şekil 2.6.	Apoptozise uğrayan hücre çekirdeği	16
Şekil 4.1.	Grupların günlük ağırlık değişimi	29
Şekil 4.2.	EAT hücrelerinin histopatolojik görüntüsü.....	30
Şekil 4.3.	Böbrek dokusunda sağlıklı kontrol grubu (histolojik), tedavi ve tümör uygulama gruplarına ait (histopatolojik) bulgular	32
Şekil 4.4.	50mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda böbrek dokusunda oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü.....	33
Şekil 4.5.	Karaciğer dokusunun sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları	34
Şekil 4.6.	Tümör kontrol grubunda karaciğer dokusunda oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü.....	34
Şekil 4.7.	Mide dokusunun sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarına ait (histopatolojik) bulgular.....	36
Şekil 4.8.	25 mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda mide dokusunun kapsülünde oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü.....	37
Şekil 4.9.	Dalak dokusunun sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları	38
Şekil 4.10.	Tümör kontrol grubunda dalak dokusunun kapsülünde oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü.....	38
Şekil 4.11.	Kalın bağırsak dokusunun orta hattından alınan sağlıklı kontrol (histolojik) ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları	39
Şekil 4.12.	Kalın bağırsak dokusunun 25 mg/kg curcumin verilen tedavi grubuna ait histolojik bulgular.	40
Şekil 4.13.	İnce bağırsak dokusunun proksimal bölümüne ait sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları	41

Şekil 4.14.	25 mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda ince bağırsak dokusundaki histopatolojik bulgular	42
Şekil 4.15.	Deney gruplarına ait apoptotik hücreler	47
Şekil 4.16.	Deney gruplarına ait damar yoğunlukları	49
Şekil 4.17.	In vitro deney gruplarında 3 saatlik canlı ve ölü EAT hücrelerinin thoma lamı üzerindeki görüntüleri	50
Şekil 4.18.	In vitro deney gruplarında 24 saatlik canlı ve ölü EAT hücrelerinin thoma lamı üzerindeki görüntüleri.....	50
Resim 4.1.	EAT hücresi verilen hayvanda assit birikimine bağlı abdominal bölgede görülen genişleme.....	27
Resim 4.2.	Deney grubuna ait farenin organlarının genel görünüşü	27
Resim 4.3.	Ehrlich solid tümörünün görünümü ve tümör boyutlarının ölçümü.....	43

1.GİRİŞ ve AMAÇ

Yaklaşık olarak yılda ortalama 10 milyon kanser tanısı konmakta ve her yıl 6 milyondan fazla kişi kanserden ölmektedir. Bugün dünya üzerinde 22 milyondan fazla kanser hastası bulunmaktadır. Uluslararası kanser ajansı 2012 yılı verilerine göre bir önceki yıla oranla kanser vakası sayısında artış olduğunu bildirmiştir. 2012 yılında Dünya’da toplam 14.1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8.2 milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiştir. Cinsiyete göre dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kanser görülme sıklığı ve ölüm oranlarına bakıldığında, erkeklerde en çok akciğer ve mide kanseri, kadınlarda ise meme ve kolorektal kanserlerin başta geldiği görülmektedir (1,2). Her iki cins için de kanser görülme sıklığı sırasıyla akciğer, meme ve kolorektal kanserleri şeklindedir. Türkiye’de 2012 yılında kanser hızı erkeklerde yüzbinde 261.4, kadınlarda ise yüzbinde 168.7’dir. Kadın erkek ortalama kanser insidansı ise yüzbinde 215.1’dir. 2012 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 97 bin erkek ve 62 bin kadın kansere yakalanmaktadır (3,4). Kansere neden olan birçok etken olup beslenme bunların arasında yer almaktadır. Beslenmenin kanser oluşumundaki payı yeni bir konu değildir. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar olan klinik tespitlerde diyetin bir risk faktörü olduğu pek çok kez ifade edilmiştir. Gıdalar söz konusu olduğunda, kanserojen oluşumların gıdada bulunma seviyesi yanında, bunlara maruz kalan bireylerin beslenme şekli ve gıda tüketim alışkanlıkları da önemli rol oynamaktadır. Kanser, pek çok faktörün bir arada etki ettiği kompleks bir mekanizma olduğundan şüphesiz ki kanserojen olduğu belirtilen maddeler tek başlarına kanser oluşumuna sebebiyet vermemektedir (5-7). Kanser tedavisinde sürekli yeni gelişmeler olmaktadır. Son zamanlarda kanser tedavisinde bitki ekstraktlarının kullanımı gün geçtikçe

artmaktadır. Bu bitki ekstrelerinden biri de curcumin'dir (8). Zingiberaceae ailesinin bir üyesi olan curcuma longa çok yıllık bir bitki olup ana vatanı Güney Asya'dır. Asıl üreticisi Hindistan olmakla birlikte Bangladeş, Çin, Endonezya, Karayip adaları ve Güney Amerika'nın birkaç ülkesinde de yetiştirilir. Turmerik tozu olarak bilinen curcuma longa, yemeklerde aroması ve sarı rengi nedeniyle köri baharatının üretiminde kullanılır. Turmerik gıda endüstrisinde renklendirici, koruyucu ve aromatik bitki olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Japonya'nın çeşitli bölgelerinde çay olarak da tüketilmektedir. Literatürde curcumin'in antineoplastik mekanizmasını ortaya koyan birçok makale bulunmaktadır. Curcuminin bazı tip kanser hücrelerinin ölüm hızını artırdığı ve tümör hücrelerinin bölünmesini durdurduğu bilinmektedir (8,9). Daha önce yapılan çalışmalarda curcumin'in güçlü bir antioksidan olduğu ve antikanserojen etki gösterdiği belirtilmiştir (10).

Kanser ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere birçok deneysel kanser modeli geliştirilmiştir. EAT modeli yaygın olarak kullanılan bir tümör modelidir (11). EAT, ilk olarak dişi bir farede spontan meme adenokarsinoması olarak ortaya çıkmış, tümör parçaları fareden fareye deri altına transplante edilerek deneysel tümör haline dönüştürülmüş, daha sonra farelerin peritonunda sıvı halde büyüyen formu elde edilmiş ve peritonda hücrelerin yanı sıra asit sıvısı da olduğu için tümör Ehrlich Ascites Tümörü adını almıştır (12,13).

Bu çalışmanın amacı Balb/C türü farelerde deneysel olarak oluşturulan EAT hücrelerinin intraperitoneal ve subkutan enjeksiyonu ile elde edilen asit ve solid tümör üzerine curcumin'in antitümöral etkisini araştırmaktır.

2.GENEL BİLGİLER

2.1. KANSER

Kanser, çağımızın en ciddi hastalığı olmakla beraber insan ölümlerine yol açan nedenler arasında önemli bir yere sahiptir (14,15). Birçok kanser türü sadece bir hücreden (ya da az sayıda hücreden) ortaya çıkmaktadır (16,17). Kanser, hücrenin büyümesi ve hücre mitozunu kontrol eden hücre genlerinin mutasyonu ya da anormal şekilde aktivasyonu sonucunda ortaya çıkmaktadır (18). Tümörlerin kökeninde normal büyümenin kontrol mekanizmalarına verilen yanıtın kaybolması durumu mevcuttur. Herhangi bir prokarsinogenin, metabolik aktivasyonu ile tetiklenen bir dizi aşamadan sonra neoplastik hücre oluşmaktadır (19). Neoplazmlar “tümör” adıyla anılır. Aslında tümör yalnızca bir dokuda ödem, hemoraji ve başka bir şekilde oluşturulan şişlik anlamına gelmektedir (18, 20). Normal hücre ile kanser hücresi arasında farklılıklar bulunur. Normal hücrelere göre kanser hücreleri birbirlerine daha az tutunurlar (21). Bu yüzden bu hücrelerin dokular arasında gezmeye eğilimleri vardır. Kan dolaşımına girerek vücuda dağılırlar ve yeni kanser odakları oluştururlar. Kanser hastalığının sebebi günümüzde multifaktöriyel olarak gösterilmektedir. Sigara, mikroorganizmalar, bazı kimyasal maddeler, hormonlar gibi nedenler kanser oluşumunu başlatabilir (4). Kanser hastalığının ilerlemesini durduran tümör baskılayıcı genlerdeki aksaklıkların genetik geçiş ile nesilden nesile aktarılması kansere yakalanma riskini daha da artırmaktadır (7). Bazı kanserler anjiyogenik faktörleri üretirler. Bunlar kanser dokusu içinde büyüyen çok sayıda damarların oluşmasına neden olarak kanserin büyümesi için ihtiyaç duyulan besin maddelerini sağlar. Anjiyogenezis daha önceden mevcut damarlardan yeni kapillerlerin oluşması durumudur (22). Kanser tedavisinde kemoteropatik ajanların yanısıra tamamlayıcı tıp olarak tanımlanan bitkisel tedavi yöntemleride dünyada sıkça çalışılan

konular arasındadır. Curcumin bu bitkisel ajanlar arasında yer olan bir bitkidir ve antioksidan özelliğe sahiptir (23).

2.1.1 Kanser ve ölüm oranları

Kanser birçok ölüme neden olmuştur ve 2012 yılında Dünya’da toplam 8.2 milyon insan çeşitli kanserler nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Her yıl kanser görülme sıklığı ve kansere bağlı ölümler giderek artmaktadır. En sık ölümlerle sonuçlanan kanserler sırasıyla akciğer, mide, karaciğer, bağırsak ve meme kanseri olarak belirtilmektedir (4,24).

2.1.2 Kanser ve Tamamlayıcı Tıp

Dünya sağlık örgütünün açıklamalarına göre tüm ölümlerin % 13’ü kanser nedeniyle olmaktadır. Dünya sağlık örgütü 2030 yılında bu oranın % 45 olacağını belirtmektedir (25). En önemli ölüm nedeni olması sebebiyle kanser oluşumunun önlenmesi, üzerinde en çok çalışılan konulardan biridir (2). Ülkemizde güvenilir veriler elde etmek amacıyla 1983 yılından itibaren ihbarı zorunlu hastalıklar grubuna alınmasına rağmen, kansere ait gerçek veriler elde edilememektedir. Yılda beklenen yeni kanser olgusu sayısı, 70-100 bin iken 1999 yılında bildirilen olgu sayısı 26 bin civarı olmuş ve bu sayı hiçbir zaman yılda 40 bini aşmamıştır (24). Gelişmiş toplumlarda kanserden kaynaklanan ölümler ilk sırada yer alırken gelişmekte olan ülkelerde ise giderek artmaktadır (14,26). Günümüzde kanser ile mücadele çok ciddi çabalar ve inanılmaz miktarlarda bütçeler harcanmaktadır. Bugün kanseri önlemede en umut verici strateji, kemoterapidir (4). Kemoterapi, insanda kanser gelişimini önleyici sentetik veya doğal maddelerin (yalnız başına veya kombinasyonu) kullanımı olarak tarif edilir. Halk tarafından kullanılan bitkiler, sebzeler ve şifalı otlar, kanser kemoterapisinin keşfedilmesinin ve gelişiminin ana kaynağı olmuştur. Dünya sağlık örgütünün (WHO) bazı ülkelerde özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde tamamlayıcı tıp %70 seviyelerinde kullanılmaktadır (27). Kemoterapide uygulanan ilaçlar, kanser hücresi üzerine toksik etki gösterirken, aynı zamanda sağlıklı hücreler üzerine de toksik etki göstermekte ve organlarda rahatsızlıklara neden olmaktadır (28).

Şekil 2.1. Normal ve kanser hücrelerinin görünümü (29).

Kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapötiklerin ve radyoterapinin önemli yan etkilerinin olması ve bazı tümörlerde kemoterapiye karşı direnç gelişmesi bu sorunların çözümü için özellikle kanserli hücrelerde apoptozu uyaran buna karşılık normal dokulara zarar vermeyen doğal maddelerin araştırılmasına sebep olmaktadır (30). Özellikle bitkilerden elde edilen ekstraktlar ile yapılan çalışmalar daha ümit verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Tıbbi bitkilerin ekstraktlarının antikanser aktivitelerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapılmakta, ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu konu ile ilgili pek çok çalışma yürütülmektedir (31).

2.2. TIPTA BİTKİ EKSTRELERİNİN KULLANIMI

Günümüzde kanser tedavisinde uygulanan temel yöntemler ve kullanılan ilaçların yetersiz olduğu düşünülmektedir. Tedavide karşılaşılan bu problemler, yeni ilaçlar bulma ve araştırma çabalarını hızlandırmaktadır. Modern tıbbın içerisinde tamamlayıcı tedavi maddeleri olarak bitkiler yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Amerikan Kanser Birliği (American Cancer Society) ve Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute), alternatif tedavileri hastalığın geleneksel tedavisinin yerine kullanılan uygulamalar şeklinde tanımlarken, tamamlayıcı tedavileri ise, modern tıp ile birlikte kullanılan tedavileri tamamlayıcı yaklaşımlar olarak tanımlanmaktadır (32,33).

Geçmişte hastalıkları tedavi edebilmek için bitkilerden yararlanıldığı bilinmektedir. Tıbbi bitkilerden elde edilen doğal ürünlerin farmakoloji alanında yeni kimyasalların gelişmesinde katkısı olduğu bilinmektedir (34). Bu bitkilerden biri de ülkemizde

Zerdeçal olarak da bilinen curcumin'dir. Curcumin yüzyıllardır gıda olarak ve bitkinin tıbbi etkilerinden dolayı da tıpta kullanılan bir bitkidir (35).

2.3. CURCUMİN (TURMERIC)

Curcumin (*curcuma longa*), zencefil ailesine ait çok yıllık otsu bir bitkidir ve yaygın olarak güney ve güneydoğu tropikal Asya'da yetiştirilmektedir (Şekil 2.2) (36). Turmeric, Zerdeçal ve Hint safranı olarak da bilinir. Çin ve Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilen sarıçiçekli, büyük yapraklı ve yumrulu bir bitkidir. Zerdeçal kullanımı çeşitli hastalıklar için tedavi edici bir ajan olarak etkili olduğu bulunduğundan bu yana, daha popüler bir hale gelmiştir (23,37). Zerdeçal, Hint tıbbında bir tonik ve kan temizleyicisi olarak kullanılmaktadır, Japonya'nın çeşitli bölgelerinde çay olarak da tüketilmektedir, Türkiye'de soğuk algınlığında, hazımsızlığı ve gaz söktürücü olarak kullanılmaktadır. Zerdeçal içinde doğal sarı bir pigment olan curcumin, bitkinin yumrularından elde edilir (38,39). Curcumin ,ilk kez 1842 yılında Vogel tarafından izole edilmiştir. Curcumin neredeyse su içerisinde hiç çözünmeyen turuncu-sarı kristal gibi bir tozdur. Curcumin'in yapısının diferuloylmethan olduğunu 1910 yılında Lampe ve Milobedeska ortaya koymuşlardır (10,40).

Şekil 2.2. Curcuma longa (41).

2.3.1. Curcumin'in kimyasal özellikleri

Curcumin polifenolik bir bileşiktir ve bis- α , β -unsature β -diketondur. Keto ve enol formu bulunmaktadır. Keto formu asidiktir ve nötral sıvı solusyonlarda ve hücre membranlarında bulunmaktadır. PH 3-7 aralığında curcumin güçlü bir H atom

donörüdür (42). Buna karşın pH 8'in üzerinde enol form hakimdir ve curcumin bir elektron donörü gibi hareket etmektedir ki bu fenolik antioksidanların toplayıcı aktivitesi için tipik bir mekanizmadır. Curcumin bazik pH'a karşı dayanıksızdır ve 30 dakika içerisinde trans-6-(4'-hidroksi- 3'-metoksifenil)-2,4-diokso-5-hekzanal, ferulik asit, feruloilmetan ve vanilline indirgenir. pH 7'nin üzerinde rengi sarıdan kırmızıya doğru döner. Moleküler ağırlığı 368.38 g/mol ve erime noktasında 183 °C'dır. Curcumin suda çözünmeyen fakat aseton, DMSO ve etanolde çözünebilir bir moleküldür (10,43).

Şekil 2.3.Curcumin'in molekül yapısı (14).

2.3.2. Curcumin'in farmakokinetik özellikleri

Curcumin'in transformasyonu bağırsaklardan absorpsiyonu sırasında gerçekleşmekte ve oldukça polar renksiz transforme ürünler meydana gelmektedir (43). Sıçanlara oral yolla curcumin verilerek yapılan bir çalışmada, curcumin'in % 60'ının emildiği ve idrar içerisinde glukuronid ve sülfat konjugatları olduğu, ayrıca curcumin'in büyük oranda gaitayla atıldığı gösterilmiştir (44). Daha sonraki yapılan çalışmalarda ise farelere intraperitoneal olarak verilen curcumin'in (0.1 g/kg) ilk olarak dihidrocurcumin tetrahydrocurcumin biyotransformasyonuna uğradığı, intraperitoneal yolla 15 dakika içerisinde maksimum plazma konsantrasyonuna (2.25 µg/mL) ulaştığı ve 1 saat içerisinde plama düzeyinin hızla düştüğü ve bu bileşiklerin hemen monoglukuronidkonjugatları haline dönüştüğü gösterilmiştir (45). Sıçanlara oral yolla verilen ve plazma içerisinde az miktarda bulunan curcumin'in yüksek oranlarda curcuminglukuronid ve curcumin sülfat, az miktarda ise heksahydrocurcumin, heksahydrocurcuminol ve heksahydrocurcuminglukuronid olabileceği gösterilmiştir (46). Curcumin'in yüksek dozlarda alındığında bile toksik etkisi olmadığı bildirilmiştir (47). Oral yolla (1g/kg) verildikten 1 saat sonra curcumin'in yüksek oranda barsakta, daha az miktarlarda dalak, karaciğer ve böbrekte, en düşük oranda beyin dokusunda bulunmuştur (48). Biotransformasyona uğramış olan curcuminin, stabil formunun tetrahydrocurcumin olduğu ve bu formun curcumin'in biyolojik etkileri üzerinde önemli

role sahip olabileceği ayrıca curcumin'in redüksiyon ve glukuronidasyon gibi enzimatik reaksiyonlarla metabolik aktivite gösterebileceği bulunmuştur (23).

2.3.3. Curcumin'in klinik özellikleri

Curcumin diyetlerde baharat, yiyecek ve tekstilde de renk verici ajan olarak kullanılmasının yanında birçok hastalıkta da tedavi amaçlı kullanılmaktadır (49). Curcumin'in birçok farklı farmakolojik aktiviteleri ve biyolojik faydaları son yıllarda önemli ölçüde dikkat çekmiştir (50). Anti-oksidan, anti-kanserojen, anti-inflamatuar, anti-alerjik, anti-demans etkileri ve serbest radikal toplayıcısı olduğu yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir (51). Ayrıca curcumin'in anoreksia, öksürük, diabetes, karaciğer rahatsızlıkları, romatizma, Alzheimer, safra ile ilgili rahatsızlıklar, sinüzit gibi hastalıklara karşı güçlü bir ajan olduğuna inanılmaktadır. *Escherichia coli* ve *staphylococcus aureus*'a karşı bakterisidal etkinliği mikrobiyolojik olarak da kanıtlanmıştır. İnsan immun yetersizliği (HIV) de de antiviral, antimalaryal, antifungal, anti-protozoal (*Leishmania major*) etkilerinin olduğu rapor edilmiştir (23)

Curcumin'in yerel olarak cilt hastalıklarında, böcek ısırıklarında ve su çiçeğinde kullanılmaktadır. Curcumin ile tedavi edilmiş yaradaki miyofibroblastlarda yara kontraksiyonu daha hızlı olmaktadır (52,53).

2.3.4. Curcumin'in antikanserojen özellikleri

Curcumin antikanser etkileri ile son yıllarda çok araştırılan bir moleküldür. Curcumin'in potansiyel antikanser etkinliği bazı araştırmacılar tarafından sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerde apoptoz oluşturmaya bağlanmaktadır (54). Curcumin'in farklı tümörler üzerinde çok çeşitli mekanizmalarla anti-kanserojenik etki gösterdiği ifade edilmiştir. Birçok çalışma curcumin'in deri, meme bezi, ağız, özafagus, mide, bağırsak, kolon, akciğer ve karaciğerin tümör genezisini baskıladığını ortaya koymaktadır (55).

Hidrofobik bir molekül olduğu için plazma membranından kolaylıkla geçerek sitozole giren curcumin, fosfatidilserin indüklenmesi, plazma membran permeabilite artışı, mitokondriyal membran potansiyelinde azalma ve hücre büzüşmesi gibi apoptotik hücrelerde gözlemlenen tipik özelliklere yol açmaktadır. Bir araştırmada histiositik hücre hattı (AK-5) tümör hücrelerinin büyümeleri üzerine curcumin etkileri araştırılmış; kontrol grubunun tümünde peritoneal şişkinlik oluştuğu ve 10. günün sonunda %90

ölüm gerçekleştiği bildirilirken Curcumin uygulanan grupta peritoneal şişkinlik %80 oranında gözlemlenmiştir ve denekler 40. günden sonra hayatta kalmışlardır. Curcumin'in 10 µM yoğunluğunda apoptozu 4. saat sonunda %40, 18. saat sonunda %100 uyardığı saptanmıştır (56).

2.4. DENEYSEL KANSER MODELLERİ

Kanser alanında uygulanan tedaviler bir önceki dönemin öğreti ve tekniklerini kullanarak veya sistemli ilaç uygulamaları ile günümüze kadar gelişme kaydetmiştir. Yalnız hangi metod kullanılırsa kullanılsın ilaç geliştirme araştırmalarında hayvan modellerinden yararlanmak bir yerde zorunluluk göstermektedir. Son yıllarda ön plana çıkan hücre kültürü veya moleküler biyoloji tekniklerine rağmen uygulanan ajanlara karşı metabolizma cevabında yaşanan eksiklikler, hayvan modellerinin kullanımından vazgeçilmesine engel olmaktadır (57).

Deneysel kanser araştırmalarının yapıldığı üç yüzyıllık dönem içinde kimyasal karsinojenler ile spontan veya transplante edilebilen tümörlerin kullanılması ön plana çıkmaktadır. Son 35 senede önceleri xeograft çalışmaları (1969), sonraları ise transgenik (1984) hayvan üretiminde hızlı gelişmeler kaydedilmiş ve bilimsel amaçlı bu üretim alanı bir ticaret sektörü haline almaya başlamıştır. Kimyasal veya fiziksel karsinojenler ile oluşturulan modeller çeşitli kimyasal ajanları deney hayvanlarına değişik yollarla vererek intraperitoneal (ip), intravenöz (iv), subkutan (sc), intramusküler (im) birbirinden farklı özellikte tümör modelleri oluşturulabilmektedir (57).

2.4.1. Spontan veya transplante edilebilen tümör modelleri

Bu grup içinde bulunan transplante edilebilen tümör modelleri spontan oluşan tümörlerden elde edilen süspansiyonlardan türetilmektedir. Spontan oluşan tümörle insan kanser tiplerine kinetik özellik açısından benzerlik göstermektedir. Dezavantajı geç dönemde ölçülebilir boyuta ulaşırlar. Solid tümörler sc, im, ip veya iv yolla hücre süspansiyonlarının inokulasyonu sonucunda transplante edilirler. Transplante edilen tümörler köken aldıkları spontan tümörlere erken oluşum fazları açısından oldukça benzerlik gösterirler. İyi karakterize edilmiş ve üretilebilir özellikte olup, ilaç takip çalışmalarında tercih edilmektedirler (57,58).

2.4.2. Ehrlich Assit Tümörü (EAT)

Günümüzde tedavide başarılı olmak ve kansere karşı yeni yöntemler geliştirmek üzere yapılan çalışmalar deney hayvanlarında oluşturulan bu deneysel hayvan tümörleri üzerinde sürdürülmektedir. Tümör hücrelerinin peritoneal boşluk içerisine enjekte edilmesinden sonra çoğalan neoplastik hücreleri içeren efüzyonun gerçekleşmesi "assit" terimi ile belirtilmektedir. Uygulanan bu tümör modellerinde hücre sayısında kademeli olarak çoğalma gözlenirken, elde edilen pasajların tekrarlanması ile pasajlarda tümör virülansı artmaktadır (12). Elde edilmişinden bu yana pek çok araştırmaya konu olan deneysel hayvan tümörlerinden biri olan EAT, ilk olarak dişi bir farede spontan meme adenokarsinoması olarak ortaya çıkmış ve Ehrlich&Apollant (1905) tarafından tümör parçaları fareden fareye deri altına transplante edilerek deneysel tümör haline getirilmiştir (59,60). Loewenthal ve Jahn (1932) bu tümörün farelerin peritonunda sıvı halde büyüyen formunu elde etmeyi başarmışlar ve peritonda hücrelerin yanı sıra asit sıvısı da oluştuğu için tümör Ehrlich Ascites Tümörü adını almıştır (61).

EAT diferansiye olmamış bir tümördür. Transplante edilebilme oranı yüksek olan, regresyon göstermeyen, hızlı proliferasyona, kısa yaşama süresine sahip, %100 ölüme götüren ve immünolojik açıdan tümör spesifik transplantasyon antijenleri (TSTA)'ne sahip olmayan bu tümörün orijinali hiperdiploiddir (12).

Tümör hücrelerinin herhangi bir vücut boşluğuna enjekte edilmesinden sonra orada çoğalmaları ile neoplastik hücreler ihtiva eden bir effüzyon meydana gelmesi, assit terimi ile ifade edilir. Genellikle tümörler tekrarlayan pasajlarla virülanslarını arttırlar. Bu gibi tümörlerin büyüme hızı artar. Differansiyasyon gitgide kaybolur, gelişmeyi kontrol eden başlıca mekanizmalardan sıyrılır, heterotransplantabilite kabiliyeti kazanır ve nihayet assit formuna dönüşebilirler (13). Assit, gri-beyaz bazen hafif kanlı görünümde koyu bir sıvı olup, 0.1cc'de yaklaşık 10 milyon neoplastik hücre içerir (62).

EAT'nin sıvı formunun elde edilmesiyle birlikte, çalışmalarda yoğun bir şekilde sıvı tümör kullanılmıştır. Kullanımdaki yoğunluğun nedeni, sıvı formun serbest tümör hücrelerini içeren süspansiyon şeklinde olması ve bunun sonucunda istenilen sayıdaki hücrenin bir başka hayvana transplante edilebilmesidir. Dolayısıyla alışılmış basit sayma yöntemleriyle hem transplante edilen tümör hücre sayısının, hem de oluşan tümör büyüklüğünün kolay bir şekilde saptanabilmesi mümkün olmaktadır (13,14).

EAT amaca göre assit form veya solid form olarak kullanılmaktadır. Eğer tümör hücresi içeren assit sıvısı deney hayvanına ip yolla enjekte edilirse assit form, sc yolla enjekte edilirse solid form elde edilir. EAT hücreleri, farelerin peritoneal boşluğunda süspansiyon halinde çoğalırlar ve in vitroda yapay yüzeylere yapışmazlar. Pasajdan 4-6 gün sonra assit oluşmaya başladığı anlaşılabilir ve toplam 5-12 cc assit teşekkül eder (63). EAT hücreleri, farenin peritoneal boşluğuna inokulasyonu takiben 2 fazda çoğalırlar. Bu fazlar, hücre sayısının eksponansiyel olarak arttığı çoğalma fazı ve bunu izleyen, hücre sayısının hemen hemen sabit kaldığı plato fazıdır (64,65). Yapılan araştırmalarda, 3×10^6 EAT hücresinin ip enjeksiyonundan sonra hücre sayısının 9. güne kadar eksponansiyel olarak arttığı, 9. ve 10. günden itibaren de plato fazına girildiği görülmüştür (66). EAT hücrelerinin %100 kötü huylu hücreler olmaması, çok kısa ömürlü olması ve transplantasyon özelliğinin diğer tümör modellerine göre daha hızlı olması nedeniyle kanser modelleri içerisinde yaygın olarak tercih edilen bir modeldir (12).

2.4.3. Ehrlich Solid Tümörü

Ehrlich tümörü hücrelerinin deri altına verilmesi ile tümör oluşturulmuş olur. Tümörün 1cm'lik bir çapa ulaşması bir haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Tümör 1 cm'lik büyüklüğe ulaştığında tümör'ün ortasında nekrotik saha gözlemlenmektedir (13). Tümör hücreleri eşit büyüklükte değildir. Solid tümörün yavaş büyümesinin sebebi olarak hücre ölümünün fazla olması gösterilmektedir (67,68). Tümörün büyüme göstermesi malign tümör olduğunu göstermektedir. Solid tümör elde etmek için subkutan olarak tümör hücresi 1×10^6 ml'lik hücre süspansiyonu deri altına enjekte edildiğinde bir haftalık süre sonrasında ölçülebilecek düzeyde solid tümör oluşmaktadır (62). Solid tümör oluşturulan deney hayvanlarında tedavi uygulanmazsa yaşam süresi yaklaşık olarak 40 gün kadardır (12,57).

2.5.DENEYSEL ÇALIŞMALARDA KANSERLİ DOKULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.5.1. Apoptoz

Genel olarak canlı organizmalarda iki tip hücre ölümü vardır. Bunlardan biri nekroz, diğeri apoptozdur. Nekroz, hücre yaralanmaları sonucu hücrenin zarar görerek şişmesi

ve patlayarak ölmesidir. Apoptoz ise hücre ölümü tek bir hücrede, büzüşme ve çevre hücrelerle olan temasın kaybolması ile karakterizedir (69,70).

Apoptoz; Yunan dilinde çiçeğin yapraklarının düşmesi, dökülmesi anlamına gelen bir sözcüktür. Programlanmış hücre ölümü terim olarak ilk kez 1965 yılında kullanılmıştır. Apoptoz terimi ilk kez 1972 yılında Kerr ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Köken olarak "apo-TOE-sis" 'den gelmektedir (71). Zamanı gelince ölen hücreler daha önceden programlanmış bir şekilde ölürler ("programmed cell death"). Tüm bu ölümler fizyolojik şartlarda meydana geldiği için bu ölüm şekli fizyolojik hücre ölümü ("physiological cell death") olarak da adlandırılır. Ayrıca, bir şekilde DNA'sı hasarlanmış (virüs etkisi veya çevresel nedenlerle) hücreler organizmanın zarar görmemesi için kendilerini öldürürler ("cell suicide") ve bunu organizmanın yararı için yaparlar. Doku homeostazisi için (örneğin yara iyileşmesi veya barsak hücrelerinin turnover"ında olduğu gibi) hücreler ortamdaki ölümlerle kaybolur ("cell deletion"). İşte, tüm bu kavramlar (programlanmış hücre ölümü, fizyolojik hücre ölümü, hücre intiharı, hücre kaybı) apoptoz ile eşanlamlı olarak kullanılabilen ve literatürde yer alan ifadelerdir (72,73)

Çok hücreli canlılarda asıl amaç hem yeni hücre üretmek hem de hücreler yaşlandığında veya aşırı çoğalmaya başladığında bu hücrelerin apoptoza gitmesini sağlayarak organizmanın homeostazisini korumaktır. Apoptoz'da ana morfolojik olay, nükleusun yoğunlaşması ve daha sonra parçalara ayrılmasıdır. Normalde bir hücrede birbirini takip eden 7 kırılma onarılmışken, apoptoz da yaklaşık 300.000 kırılma meydana gelir ve hücre onarımı yapılamaz (73,74). Apoptoz da ise hücreler birçok uyarıya ölüme giderler; ancak bu ölüm programlı, kontrollü ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Bu süreç nekrotik hücre ölümünden farklıdır. Nekrotik ölümden hücre kontrolsüz biçimde ölüme gider, hücre parçalanır, enflamasyon görülürken apoptoz da hücre kendi ölümü sırasında aktif rol alır ve kendi ölümünün her aşamasına katkıda bulunur (75). Bu nedenle de apoptoz hücre intiharı olarak bilinir. Nekrozda patlayan hücre içerikleri komşu hücrelere zarar verirken, apoptozda çevre hücreler zarar görmez ve ölen hücreden etkilenmez. Apoptoz hem fizyolojik hem de patolojik şartlar altında meydana gelebilirken nekroz fizyolojik bir ölüm şeklidir. Apoptotik hücrede kromatin nükleus membranı agregasyon gösterir ve kondanse olur ancak nekrozda kromatin paterni normal hücredekine benzerdir (71). Nekrotik hücrenin plazma membranı bütünlüğünü kaybeder ve hücre içinden dışına

hücre içi materyallerinin çıkışı gerçekleşir (Şekil 2.4) (76,77). Apoptoz ile ölen bir hücrede hücre membranında enflamasyon gözlenmez; nekrozda ise, enflamasyon, hücresel şişme ve hücre zarının bozulması gözlenir (78). Apoptoz bir hücre hasarına yanıt olarak meydana gelir oysa nekroz genelde hasar sonucu gelişir. Apoptoz önceden bir yol ile koordineli olarak meydana gelirken, nekroz birçok biyokimyasal olaydan bağımsız olarak gerçekleşir ve hücrede enerji stoklarının tükenmesi ile aktive olur (79). Apoptozda hücre büzülür ve komşu hücrelerden ayrılır. Hücre yüzeyinde 17 kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar kaynamayı andıran bir görüntü oluşturur. Hücre içi organeller yapılarını korurken çekirdekte dağınık halde bulunan kromatin, çekirdek zarında yoğun heterokromatin birikintiler şeklinde gözlenir. Ayrıca apoptoz izlenen hücrelerde daha ileri değişikliklerin tipik göstergesi; çekirdeğin parçalara ayrılması ve hücrenin "apoptotik cisimcik" adı verilen çok sayıda yuvarlak biçimde yapılara bölünmesidir (71).

Şekil 2.4. Apoptozis ve nekrozis (80).

2.5.1.1. Apoptoza giden hücrede morfolojik değişiklikler

Apoptotik hücreler, dokuda 4-9 saat boyunca tanınabilir haldedirler ve diğer organeller gibi lizozomları da bozulmadan kalır. Apoptotik cisimler makrofajlar veya makrofaj aktivitesi gösterebilen hücreler tarafından fagosite edilirler. Apoptotik cisimciklerin makrofajlar tarafından tanınmasında, Fas ve Cd-36'nın rol oynadığı bildirilmiştir (71).

Şekil 2.5: Apoptoza giden hücrede morfolojik değişiklikler (81).

2.5.1.2. Apoptozun aşamaları

- Apoptozun indüksiyonu
- Hücre yüzey ölüm reseptörlerinin uyarılması
- Sitokrom-c'nin salıverilmesi
- Apoptozom oluşumu (sitokrom-c + Apaf-1 + kaspaz-9)
- Mitokondriyal transmembran potansiyelin değişmesi
- Kaspazların aktivasyonu
- Fosfatidilserinin hücre membranının iç yüzünden dış yüze transloke olması
- Yapısal proteinlerin yıkılmasına bağlı olarak apoptoza özgü morfolojik değişikliklerin meydana gelmesi (82).

Apoptozun görüldüğü hücre çeşitleri apoptotik hücreler organizmanın bazı dokularında ve hücrelerinde sürekli olarak oluşmaktadır ve bu oluşum ömür boyu devam

etmektedir. Böylece ölüm (apoptoz) ve yeniden yapım (mitozis) bu dokularda doku homeostazisini oluşturmak üzere dinamik bir denge halinde süregelir (83).

2.5.1.3. Apoptozun indüklenmesi

Apoptozu başlatan nedenler çeşitlidir. Apoptoz klasik olarak, hücre ölüm reseptörleri olarak bilinen Fas (diğer isimleriyle APO-1, CD95) ve tümör nekroz faktör (TNF) reseptörü-1 (TNFR-1)'in ilgili ligandları ile etkileşime girmesi (uyarılmaları) sonucu indüklenir (84). Bu hücre yüzey reseptörleri membranda bulunur ve TNF ailesinin üyesidirler. Fas lenfoid hücrelerde, hepatositlerde, bazı tümör hücrelerinde, akciğerlerde, hatta miyokarda bulunur. İlgili ligandına Fas ligand (FasL) denir. FasL, TNF ailesinin bir üyesidir. FasL sitotoksik T lenfositlerinde ve “natural killer” hücrelerde bulunur. Fas ve TNFR-1, ligandlarıyla bağlandıklarında ölüm uyarısı almış olduklarından bir seri protein:protein interaksiyonlarından geçerler. Öncelikle kendilerine doğal olarak bağlı bulunan ve ölüm bölgeleri (“death domain”) adı verilen TRADD (“TNFR-1 associated death domain”) ve FADD (“Fas associated death domain”) ile interaksiyona girerler. Bu ölüm bölgeleri ise prokaspaz 8'i aktifleştirerek kaspazların kaskad tarzında aktivasyonlarını başlatırlar. Hücre içinde ayrıca bu ölüm bölgelerini inhibe eden proteinler de bulunmaktadır (85). Apoptoz yukarıda da belirtildiği gibi genotoksik ajanların etkisiyle yaratılan ağır DNA hasarına yanıt olarak anti apoptotik (bcl-2) ve pro apoptotik (p53) olan onkoprotein grubunun indüksiyonuyla da başlatılabilir. İndüklenen p53, bir pro-apoptotik ailesi üyesi olan bax'ın indüksiyonuna yol açarak apoptozu başlatır (86,87).

Şekil 2.6: Apoptozu uğrayan hücre çekirdeği (88).

2.5.2. Tümör anjiogenezisi

Anjiyogenez kavramının tarihçesine bakıldığında yaklaşık 100 yıl önce tümör içerisinde yeni damar gelişimlerinden bahsedildiği görülmektedir. Damar gelişimi karmaşık bir süreç olmakla birlikte vaskulogenezis ve anjiogenezis süreçleri ile birlikte şekillenen bir gelişim sürecidir (89,90).

Damar gelişim süreci doğal olarak vücutta bulunan bir mekanizmadır, bazı durumlarda bu süreç patolojik de olabilir (91). Angiogenesis tümör gelişiminde ve metastazda önemlidir. Tümörler ilişkili anjiogenik faktörler tümör hücresi tarafından veya inflamatuvar hücrelerden gelişebilir. En önemli anjiogenik faktörler vascular endothelial growth factor (VEGF) ve basic fibroblast growth factor (bFGF)'dir. Son çalışmalar tümör hücrelerinin hem anjiogenetik hem de antianjiogenetik faktörleri indüklediğini ortaya koymuştur. Anjiogenezis embriyolardaki ve yetişkinlerdeki mevcut damarlardan tomurcuklanma yolu ile yeni kan damarlarının gelişme sürecidir (92,93). Yapılan araştırmalarda tümör damarları hakkında bu damarların yeni çoğalan damarlar olup olmadığı, anjiogenezis sürecindeki adımlar nelerdir, anjiogenezis engellenebilir bir süreç midir? gibi sorulara cevap aranmıştır. Tümör gelişiminde iki süreç öne çıkar bunlar prevasküler ve vasküler faz evreleridir. Prevasküler faz sürecinde tümör 2-3 mm çaptan daha fazla büyüme gösterir. Bu fazda tümör hücreleri hızlı gelişim gösterir.

Tümör, damar yapısının artmasına bağlı olarak, hızlı bir şekilde büyür. Tümör içinde oluşan kan damarları tümör hücreleri için sadece oksijen ve besin kaynağı değildir aynı zamanda tümör hücrelerince oluşturulmuş olan atıkların uzaklaştırılması gibi görevlerde üstlenirler. Vasküler fazda, tümör hacmindeki artış azalmış olabilir bunun sebebi olarak tümör hücresinde görülen apoptoz gösterilmektedir (92-95).

Vaskulogenezis; Primitif vasküler ağ embriyonik gelişim süresince anjioblast denen endotel hücre prekürsörlerinden yapılıdır (96).

Anjiogenezis veya neovaskülarizasyon; Önceden var olan damarların yeni damar oluşturmak üzere kapiller tomurcuk geliştirmesi (96,97).

2.5.2.1. Anjiogenezis Basamakları

- 1) Bazal membranın proteolitik yıkımı
- 2) Endotel hücresinin anjiogenik stimulusa göçü
- 3) Endotel hücre proliferasyonu
- 4) Endotel hücre maturasyonu, kapiller tüp oluşumu
- 5) Periendothelyal hücrelerin endotel tüpleri desteklemek için toplanması ve damarın fonksiyon görüp devamlılığının sağlanması

Bu basamakların her biri Growth Factor (GF)'ler, vasküler hücreler ve ekstra selüler matriks ile kontrol edilir. Vaskülogenezis'de en çok rolü olan VEGF'dir. Erken vasküler gelişimde VEGF anjioblastlar üzerindeki reseptörüne bağlanır ve endotel hücre proliferasyonu gerçekleşir (98-100).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (DEKAM) temin edilen Balb/C türü fare kullanıldı. Çalışmanın deney hayvanları üzerinde gerçekleşen aşaması Erciyes Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan alınan 12/02/2014 tarih ve 14/029 sayılı karara uygun olarak DEKAM'da, deney sonrası elde edilen dokuların değerlendirilmesi ise Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarının araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

3.1. Araştırmada kullanılan denek cinsi, sayısı ve dağılımı

Yapılan bu çalışmada hayvanın soy, tür, cinsiyet, yaş ve ağırlık seçiminde yapılan diğer çalışmalardaki özellikler göz önünde bulundurularak 8-10 haftalık, ortalama 25-30 gr ağırlığında Balb/C türü olarak erkek fareler kullanıldı. Her bir grupta 10 fare olacak şekilde 8 grup oluşturulurken grupların dışında stok hayvan oluşturulması ve olası kanserli fare ölümleri de göz önünde bulundurularak 12 hayvan ayrıldı.

3.2. Deneysel Prosedür

Fareler araştırma süresince 21 °C sabit sıcaklıkta ve 12 saat aydınlık/karanlık dönemlerin bulunduğu özel hazırlanmış, otomatik olarak klimatize edilen odalarda korundu. Çalışmada gruplar oluşturulmadan önce yeterince EAT hücreleri elde etmek için öncelikle stok fare oluşturuldu. Dört grup sıvı tümör, dört grup katı tümör için olmak üzere sekiz grup hayvan rastgele olacak şekilde beşerli iki kafese konularak etiketlendi. Sıvı ve katı tümör için birer grup negatif kontrol olarak ayrılması planlanırken diğer üç gruba periton içi ve üç gruba deri altına EAT hücreleri enjekte edilerek sıvı ve katı tümör oluşturuldu. Sıvı ve katı tümör gruplarından birer grup pozitif kontrol grubunu

ikişer grup ise curcumin tedavi gruplarını oluşturuyordu. Stok hayvan oluşturulmasından sonra stok farelerden alınan EAT assit sıvısı sıvı tümör, katı tümör oluşumu ve hücre kültürü için kullanıldı. Stok hayvandan enjektör yardımı ile çekilen assit sıvısı 0.1 ml PBS içerisinde süspanse edilerek thoma lamında sayıldı ve 1×10^6 EAT hücresi farelerde sıvı tümör oluşturmak için intraperitoneal olarak enjekte edildi. Hücre kültürü için ise yine stok hayvandan enjektör yardımı ile çekilen assit sıvısı içinde bulunan hücreler sayılarak steril kültür kaplarına alınarak *in vitro* şartlarda kültüre edildi.

3.3. Stok farelerin oluşturulması

Stok hayvan oluşturulmasında -80 derecede saklanan EAT hücreleri kullanıldı. Stok hücreler oda sıcaklığında çözülerek, stok hayvana 0.1 cc olacak şekilde sol arka bacağı ve karın bölgesinin birleşim yerinden intraperitoneal verildi. Stok hayvanda 6-7 gün içerisinde assit tümör oluşumu beklenmektedir. Stok hayvandan enjektör yardımı ile çekilen assit sıvısı içindeki 1×10^6 EAT hücresi 0.1 ml fosfat buffer saline (PBS) içerisinde farelere intraperitoneal olarak verilerek sıvı tümör, ense bölgesine subkutan olarak verilerek katı tümör oluşturuldu. Stok hayvanın intraperitoneal boşluğundan alınan sıvının 1 ml'indeki EAT hücresi aşağıdaki prosedüre göre belirlendi.

3.4. Hücre Sayımı Prosedürü

- Stok hayvandan 10. günde 1ml abdominal bölgeden assit sıvısı çekilir.
- Bu sıvı üzerine 1 ml PBS konulur ve bununla birlikte toplam 2 ml sıvı elde edilir.
- 2 ml sıvıdan 100 mikrolitre (μ l) çekilerek, epondorf tüpüne konulur.
- 100 mikrolitre sıvının üzerine 100 mikrolitre tripan blue ilave edilerek toplamda 200 mikrolitre sıvı elde edilir.

Karışımdan 50 mikrolitre çekilerek, thoma lamının sayım alanına enjekte edilir. 40'lık objektifte canlı hücreler büyük karelerde sayılır. Ölü hücreler maviye boyanmış olduğu için kolayca fark edilecektir. Thoma lamının her iki sayma alanından 5'er büyük kare seçilerek içindeki canlı hücreler sayılır. Ortalamasını almak amacıyla sayılan tüm hücreler toplanarak 10'a bölünür ve thoma lamının bir sayma alanında 16 büyük kare

bulunduğu için çıkan sonuç 16 ile çarpılır. Bu sonuç ise 10^4 ile çarpıldığında 1ml'deki hücre sayısı bulunmuş olur. Bu hesaplamalarda dilüsyon oranında dikkate alınmalıdır.

3.5. Curcumin ekstraktının çözünmesi ve sterilizasyonu

Curcumin ekstraktı deney uygulama gününde DMSO (dimetil sülfoksit) ve PBS (phosphate buffer saline) tamponu ile her deney grubu için istenilen konsantrasyonları sağlayacak şekilde farklı hacimlerde çözdürüldü. DMSO oranı çalışmada %10 olarak tutuldu ve çözünme işleminden sonra filtrelerden geçirilerek steril hale getirildi. Curcumin ekstraktının çözünmesi her enjeksiyon gününde taze olarak hazırlandı.

3.6. Deney Gruplarının Oluşturulması

Çalışmamızda curcumin'in EAT hücreleri üzerindeki tedavi edici etkisi *in vivo* ve *in vitro* olarak araştırıldı. *In vivo* etki sıvı ve katı tümör üzerinde değerlendirildi. Hayvanların ağırlıkları deneyin başladığı ilk günden sakrifiye edildikleri güne kadar ölçüldü. Aynı zamanda her gün katı tümör bölgesi elle palpe edilerek tümör oluşmaya başladıktan sonra tümör çapları da kumpas ile ölçüldü. Tümör hacimlerini ölçmek için *Tümör hacmi(mm³) = En² x Boy x 0,52* formülü kullanıldı (101).

3.7. Sıvı Tümör Grupları

Grup 1: Negatif kontrol grubu: Kanseri oluşturulmadı ve hayvanlar 10 gün boyunca normal diyet ile beslenildi. 10 gün boyunca intraperitoneal yolla 0.1 ml serum fizyolojik (SF) uygulandı.

Grup 2: Pozitif kontrol grubu: Bu grupta yer alan farelere 0. gün karın bölgesine içerisinde 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml asit sıvısı intraperitoneal uygulanadı. 0. günden itibaren 10 gün süreyle farelere 0.5 ml serum fizyolojik intraperitoneal yolla enjekte edildi.

Grup 3: Tedavi grubu (25 mg curcumin): Bu grupta yer alan farelere 0. gün karın bölgesine içerisinde 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml asit sıvısı intraperitoneal uygulandı. 0. günden itibaren 10 gün süreyle farelere 25mg/kg/gün curcumin intraperitoneal enjekte edildi.

Grup 4: Tedavi grubu (50 mg curcumin): Bu grupta yer alan farelere 0. gün karın bölgesine içerisinde 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml asit sıvısı intraperitoneal

uygulandı. 0. günden itibaren 10 gün süreyle farelere 50mg/kg/gün Curcumin intraperitoneal enjekte edildi.

Tüm hayvanlar 11. gün ketamin-xylosine (50mg/kg, 15mg/kg) genel anestezisi altında sakrifiye edildi.

3.7.1. Sıvı tümör oluşturulan deney gruplarında yapılan incelemeler

Deneyin başladığı günden deneyin son gününe kadar hayvan ağırlıkları ölçüldü. Tüm gruplardaki farelerde 10. günde ketamin (0.1mg/kg) ve xylazin (0.05mg/kg) ile intramüsküler enjekte edilerek genel anestezi altında abdominal bölgeden intraperitoneal girilerek assit sıvısı 10 cc'lik enjektörle alındı ve hücre sayımı yapıldı. Daha sonra disseksiyonla karın ön duvarı açılarak intraperitoneal bölge kontrol edildi ve EAT hücrelerine bağlı olarak oluşmuş doku kitlesi var ise alınarak %10'luk soğuk formaldehit içinde tespit edildi. Ayrıca karın içi organlardan karaciğer, dalak, böbrek, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan alınan dokular rutin histopatolojik inceleme için %10'luk soğuk formaldehit içinde tespit edildi. Daha sonra hayvanların kalplerine makas ile bir kesi atılarak uyanmaları engellendi.

3.7.2. Histolojik doku takibi

%10'luk formalin fiksasyonu sonrası rutin histolojik takip aşamalarından sonra hazırlanan ve parafin bloklara gömülecek olan dokulardan 5µm'lık kesitler pli-L lizinle kaplı lamlara alındı. Histolojik doku takibi aşamaları Tablo 3.1' de verilmiştir. Elde edilen deney gruplarına ait dokulara hemotoksilen-eozin ile boyadı. Bu boyama metoduna ait prosedürler Tablo 3.2'de verilmiştir.

Tablo 3.1. Işık mikroskobunda incelenecek dokuların hazırlanma tekniği

Sıra	Yapılan işlem	Süre	Sıra	Yapılan işlem	Süre
1	Musluk suyu	1 saat	7	% 100 alkol	1 saat
2	% 50 alkol	1 saat	8	% 100 alkol	1 saat
3	% 70 alkol	1 saat	9	Ksilen 1	20 dakika
4	% 80 alkol	1 saat	10	Ksilen 2	20 dakika
5	% 96 alkol	1 saat	11	Ksilen 3	20 dakika
6	% 100 alkol	1 saat	12	Parafin	2 saat

Tablo 3.2. Hematoksilen-Eozin Boyama Tekniđi

Sıra	Yapılan iřlem	Süre	Sıra	Yapılan iřlem	Süre
1	Etüv (60 °C)	2 saat	14	Eozin	3-5 dakika
2	Ksilen I	10 dakika	15	Akarsu	1 dakika
3	Ksilen II	10 dakika	16	%50 Alkol	1 dakika
4	Ksilen III	10 dakika	17	%70 Alkol	1 dakika
5	Absolu Alkol I	5 dakika	18	%80 Alkol	1 dakika
6	Absolu Alkol II	5 dakika	19	%96 Alkol	1 dakika
7	%96 Alkol	5 dakika	20	Absolu Alkol I	1 dakika
8	%80 Alkol	5 dakika	21	Absolu Alkol II	1 dakika
9	%70 Alkol	5 dakika	22	Absolu Alkol III	1 dakika
10	%50 Alkol	5 dakika	23	Ksilen I	5 dakika
11	Akarsu	5 dakika	24	Ksilen II	5 dakika
12	Hematoksilen	6-8 dakika	25	Ksilen III	5 dakika
13	Akarsu	5 dakika	26	Entellanla kapatılır	

3.8. Katı tümör grupları

Grup 1: Negatif kontrol grubu: Kanser oluşturulmadı. Hayvanlar 15 gün boyunca normal diet ile beslendi. 15 gün boyunca subkutan yolla 0.1 ml serum fizyolojik (SF) uygulandı.

Grup 2: Pozitif kontrol grubu: Bu grupta yer alan farelere 0. gün ense bölgesinden içerisinde 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml assit sıvısı subkutan yolla uygulandı. 0. günden itibaren 15 gün süreyle farelere 0.5 ml serum fizyolojik subkutan yolla enjekte edildi.

Grup 3: Tedavi grubu (25 mg curcumin): Bu grupta yer alan farelere 0. gün ense bölgesinden içerisinde 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml assit sıvısı subkutan yolla uygulandı. 0. günden itibaren 15 gün süreyle farelere 25 mg/kg/gün curcumin subkutan olarak enjekte edildi.

Grup 4: Tedavi grubu (50 mg curcumin): Bu grupta yer alan farelere 0. gün ense bölgesinden içerisinde 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml assit sıvısı subkutan yolla uygulandı. 0. günden itibaren 15 gün süreyle farelere 50 mg/kg/gün curcumin subkutan yolla enjekte edildi.

Katı tümör çalışmasında kullanılan hayvanların tamamı 15. gün ketamin-xylosine genel anestezisi altında sakrifiye edildi.

Deney sonrasında hayvanlardan alınan tümör doku örnekleri histopatolojik incelemeler için %10'luk formaldehit solüsyonu ile tespit edildi. Tespit işleminden sonra dokulara rutin doku takip aşamaları uygulanarak parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan alınan kesitler polilizin kaplı lamlara yayıldı. Hazırlanan lamalar standart histolojik yöntemler kullanılarak ksilen ile parafini uzaklaştırıldı ve dereceli alkol serilerinden geçirilip sulandırıldı. Genel histolojik yapıyı görmek amacıyla kesitler hematoksil-eozin (H&E) ile boyanarak mikroskop altında incelendi.

3.9. İmmunohistokimyasal uygulama

3.9.1 Apoptoz tunel boyama metodu

Kontrol ve deney gruplarına ait doku kesitlerinde apoptotik hücrelerdeki DNA sarmal kırıklarının in situ saptanmasında en duyarlı ve en hızlı metot olarak TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP Nick end Labeling) işaretleme yöntemi kullanılmıştır. Özetle, poli-Llizinle kaplı lamlara alınan 5µm'lık kesitler ksilende deparafinize edildi, azalan alkol serilerinden geçirildi ve oda sıcaklığında PBS (phosphate buffer saline)'de 5 dk inkübe edildi. 15 dk proteinaz K ile inkübe edilen kesitler distile su ile yıkandıktan sonra endojen peroksidaz aktivitesini bastırmak için %30'luk H₂O₂ ile muamele edildi. Sonraki basamaklar için kitte (Apoptaq In Situ Cell Death Detection Kit, Millipore, S7110) bulunan ve üretici firma tarafından önerilen boyama metoduna uygun olarak immunofluoresan boyama yapıldı. Bunun için, PBS ile yıkanan kesitler TdT enzimi ile 37°C'de karanlık ve nemli ortamda 60 dakikada inkübe edildi. Tekrar PBS ile yıkanan kesitler oda sıcaklığında anti-digoxigenin conjugate ile tepkimeye girdi. Bütün inkübasyon basamakları nemli ortamda yerine getirildi. Görüntü elde etmek için slaytlar immunofluoresan mikroskopunda (Olympus BX 51) incelendi. Floresan izotiyosiyanat (FITC) ve 4',6-diamidino-2-phenylindole(DAPI) sonrası elde edilen görüntülerde apoptotik hücreler belirlendi.

3.9.2. Faktör 8 boyama

Çalışmamızda farelerden elde edilen solid tümör dokularında ve Faktör 8 ekspresyonunu belirlemek için avidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı.

Polilizinli lamlara alınan tümör doku kesitleri kasetler içerisine yerleştirilerek bir gece etüvde 60°C'de inkübe edildi. Daha sonra ksilen ve arkasından azalan dereceli alkol serilerinden geçirilerek rehydrate edildi. 3 kere 2'şer dakika distile su ile yıkandı. Arkasından antijen geri kazanımı için % 10 luk sitrat buffer mikrodalga içinde 600 w'de 5 dakika sıcaklık uygulanıp sonrasında oda sıcaklığında 10 dakika soğumaya bırakıldı. PBS ile yıkanan kesitler endojen peroksidaz aktivitesini engellemek için 12 dakika %3 hidrojen peroksit (H₂O₂) ile muamele edilerek tekrar PBS ile yıkandı. Bundan sonraki aşamalar için boyama kiti (Thermo Scientific) kullanıldı. Tekrar PBS ile yıkanan kesitlere antijenik alanların dışında kalan bölgelerin kapatılmasını sağlamak için oda sıcaklığında 10 dakika blok serum uygulandı. Daha sonra faktör 8 hazırlanıp dokulara damlatıldı. Negatif kontrol için dokulara fosfat tamponundan damlatıldı. Arkasından kesitler tank içerisine yerleştirilip 1 gece +4°C'de bekletildikten sonra 30 dakika oda ısısında inkübe edildi. Daha sonra fosfat tamponu ile yıkama işlemi yapıldı. Daha sonra fare dokularına bağlanabilen biotin-sekonder antikor ile 10 dakika oda sıcaklığında inkübe edildi. Yeniden yıkama işlemi yapılacak ve 10 dakika oda sıcaklığında streptavidin peroksidaz ile muamele edildi. Yeniden yapılan yıkama işleminden sonra immünreaktiviteyi görünür hale getirmek için diaminobenzidin (DAB) (Thermo Scientific) özelliği gösteren kitteki peroksidaz substrat ile 1.5 dakika muamele edildi. Arkasından 6 dakika distile su ile yıkandı. Gill hematoksilen ile zıt boyanan kesitler birkaç kez distile su ile yıkandı. Son olarak artan alkol serileri ile suyu uzaklaştırılıp ksilenden geçirilen kesitler kapatma solüsyonu (Entellan®, Merck) ile kapatıldı ve Olympus BX51 mikroskobunda incelendi.

3.10. In vitro deney grubu

Hücre kültürü için daha önce yapılan çalışmalar incelenerek curcumin'in 10 µg/ml, 20 µg/ml ve 30 µg/ml dozlarının EAT hücreleri üzerine etkisi araştırıldı. Curcumin %10 DMSO ve PBS içinde çözdürüldü. Kültür besi yeri (%20 Fetal Bovine Serum, %80 Dulbeccos Middle Eagle Medium ve 1ml penicilin/streptomycin: 10,000 unit/ml penicilin, 10 mg/ml streptomycin) ile hazırlandı. 96'lık plateler her grupta 24 kuyucuk olacak şekilde tümör kontrol, 10 µg/ml, 20 µg/ml ve 30 µg/ml curcumin tedavi grupları olarak 4 gruba ayrıldı. Herbir kuyucukta 160 µl medium içerisinde 104.000 EAT hücresi olacak şekilde 3 ve 24 saat CO₂ Incubator'de inkübe edildikten sonra hücreler sayıldı.

3.10.1. Hücre sayımı

Herbir kuyucuktaki medium içinde suspansiyon halindeki EAT hücreleri eppendorf tüpüne kondu. Üzerine 100 µl Trypan Blue ilave edilerek pipetaj yapıldı. Thoma lamı düz bir zemin üzerine koyularak ve lamelin yapışması gereken sayım alanı çerçevesinin üzerine lamel kapatıldı. Thoma lamının her iki yanında bulunan kanalların ortasında kalan sayım alanında lamelin lam ile birleştiği noktaya pipetin ucunu dayayarak tam orta noktasından yavaşça 50 µl hücre solusyonu sayım alanına pipetlendi. Daha sonra Thoma lamı mikroskobun tablasına yerleştirildi. 15-20 saniye kadar beklerken mikroskop objektifi 40X'e ayarlanarak sayma alanı bulundu. Hücreler tek tek sayılarak not edildi.

3.11. Sonuçların Değerlendirilmesi

İstatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Inc., ILL, USA) programı kullanıldı. Gruplar arasındaki kilo ve Faktör 8 ile ilgili analizlerde independent sample T testi kullanıldı. Gruplar arasındaki hacim karşılaştırması için Mann Whitney U testi ve *in vitro* deney gruplarında doz karşılaştırmada Kruskal Wallis testleri uygulandı. Veriler ortalama $\pm$ standart sapma olarak ve medyan (%25-% 75) olarak belirlendi. İstatistiksel analiz $p < 0.05$ ise anlamlı olarak değerlendirildi.

4. BULGULAR

Deney gruplarından sađlıklı kontrol grup hariç diđer grupları oluřturan deneklere 1×10^6 EAT hücresi intraperitoneal olarak enjekte edildikten sonra sađlıklı kontrol grubuna göre tümör kontrol grubundaki hayvanların tamamında karın bölgesinde assit birikimine bađlı olarak geniřleme görüldü. 25mg/kg curcumin uygulama grubundaki 6 hayvanın karın bölgesi assit birikimine bađlı olarak geniřlerken diđer 4 hayvanda karın bölgesinde bir geniřleme gözlenmedi. 50mg/kg curcumin uygulama grubunda ise 4 hayvanın karında assit birikimine bađlı olarak geniřleme gözlendi (Resim 4.1). Karında geniřleme olmayan hayvanların deney sonunda karınları açıldıđında periton içinde bir miktar assit birikiminin mevcut olduđu ve adipoz dokuya benzer bir dokunun bazı deneklerin karın ön duvarında ve karın içi organların üzerinde olduđu gözlendi.

EAT hücrelerinin intraperitoneal yolla enjekte edildiđi hayvanların karın içi organlarında sađlıklı kontrollere göre morfolojik olarak bir farklılık gözlenmemiřtir (Resim 4.2).

Resim 4.1 EAT hücresi verilen hayvanda assit birikimine baęlı abdominal bölgede görülen genişleme.

Resim 4.2 Deney grubuna ait farenin organlarının genel görünüşü

4.1. Deney süresince assit tümör gruplarının vücut ağırlık değişimleri

Deney süresince (10 gün) günlük olarak gruplara ait hayvanların vücut ağırlıkları ilgili verilere bakıldığında tümör kontrol grubunda 4. günden itibaren hızlı bir artış gözlenmiştir (Tablo 4.1). Bu hayvanlardaki kilo artışının nedeni intraperitoneal sıvıda tümör hücrelerinin artmasıdır. Tedavi gruplarında ise bu artışın daha geç olduğu, 25mg/kg curcumin verilen grupta yedinci günden itibaren, 50mg/kg curcumin verilen grupta ise sekizinci günden itibaren gözlenmiştir. Birinci ve onuncu günler arasında en fazla kilo artışı farkı tümör kontrol grubunda gözlenirken (19.11 g), bunu sırasıyla 25g/kg curcumin verilen tedavi grubu (10.06 g) ve 50mg/kg curcumin verilen tedavi grubu (7.49 g) izlemiştir (Şekil 4.1 ve Tablo 4.2).

Sağlıklı kontrol grup kendi içerisinde deney günleri boyunca karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığı görülürken, tümör kontrol ve tedavi grupları kendi içerisinde deney boyunca ilk gün ile diğer günlerin kilo farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$).

Tablo 4.1. Kontrol ve tedavi grubuna ait farelerin vücut ağırlıklarının 1-10 gün aralığında değişimi. Ağırlıklar ortalama $\pm$ standart sapma olarak verilmiştir.

Günler	Negatif kontrol Grubu gr $\pm$ SS (n=10)	Tümör Kontrol Grubu gr $\pm$ SS (n=10)	25 mg/kg Curcumin gr $\pm$ SS (n=10)	50 mg/kg Curcumin gr $\pm$ SS (n=10)
1	30.98 $\pm$ 2.29	31.19 $\pm$ 1.45	31.96 $\pm$ 2.78	32.91 $\pm$ 1.80
2	30.98 $\pm$ 2.29	31.77 $\pm$ 1.53	33.25 $\pm$ 2.52	33.62 $\pm$ 1.96
3	30.98 $\pm$ 2.29	32.74 $\pm$ 1.57	33.99 $\pm$ 2.14	34.04 $\pm$ 1.90
4	30.98 $\pm$ 2.29	35.24 $\pm$ 1.74	34.07 $\pm$ 2.65	34.32 $\pm$ 1.87
5	31.35 $\pm$ 2.26	37.89 $\pm$ 2.07	35.56 $\pm$ 3.63	35.36 $\pm$ 1.72
6	31.70 $\pm$ 2.32	41.11 $\pm$ 2.76	36.71 $\pm$ 4.52	36.25 $\pm$ 2.48
7	31.55 $\pm$ 2.15	43.39 $\pm$ 2.07	38.62 $\pm$ 5.02	37.35 $\pm$ 3.74
8	31.00 $\pm$ 2.00	45.03 $\pm$ 2.71	39.67 $\pm$ 5.23	39.01 $\pm$ 5.24
9	31.43 $\pm$ 2.22	47.53 $\pm$ 2.11	40.43 $\pm$ 5.16	39.93 $\pm$ 4.98
10	31.35 $\pm$ 1.90	50.30 $\pm$ 2.38	42.02 $\pm$ 4.92	40.40 $\pm$ 5.37

Şekil 4.1 Grupların günlük ağırlık değişimi

Tablo 4.2. Gruplar arasında birinci günden başlayarak vücut ağırlıklarındaki ortalama değişim

Günler	Negatif kontrol grubu gr± ss (n=10)	Tümör kontrol grubu gr± ss (n=10)	25mg/kg Curcumin gr± ss (n)=10	50 mg/kg Curcumin gr± ss (n)=10
1-2	0.00± 0.00	0.58 ± 0.58	1.29*±0.97	0.71 ±0.53
1-3	0.00± 0.00	1.55* ± 0.80	2.03*±1.15	1.13*±1.00
1-4	0.00± 0.00	4.05* ± 2.02	2.11*±0.88	1.41*±0.85
1-5	0.36±0.35	6.70* ± 2.06	3.60*±2.56	2.45*±2.13
1-6	0.71±0.57	9.92* ± 1.66	4.75*±3.39	3.32*±3.01
1-7	0.56±0.41	12.20*±1.41	6.66*±4.15	4.44*±4.09
1-8	0.01±0.34	14.24*±1.95	7.71*±4.65	6.10*±5.87
1-9	0.45±0.45	16.34*±1.70	8.47*±4.26	7.02*±5.54
1-10	0.36±0.48	19.11*±2.38	10.06*±4.22	7.49*±5.97

Kontrol ile karşılaştırıldığında *p<0.05. Yüzde değişimi=(Son gün-İlk gün)/Son gün.

4.2. Histopatolojik Bulgular

Çalışmamızda karın içi organlardaki EAT hücre metastazının daha iyi anlaşılması için EAT hücreleri tarafından deri altında oluşturulan bir solid tümör kesitindeki hücre yapısı Şekil 4.2’de verilmiştir. Yapılan histopatolojik incelemeler sonrasında sağlıklı kontrol gruplarının dokuları normal histolojik özellikler gösterirken, EAT hücresi verilen gruplarda karaciğer, böbrek ve dalak gibi organların doku kapsülüne, sindirim sistemine ait organların ise tunika serozalarına invaze olmuş dağınık halde EAT hücre toplulukları gözlemlendi. Kanser grubu hayvanların karın bölgesi genişlemeyenlerinde de benzer histopatolojik yapı gözlemlendi (Şekil 4.2-4.14).

Şekil 4.2. EAT hücrelerinin histopatolojik görüntüsü. EAT hücreleri iri hiperkromatik nükleuslu ve eozinofilik sitoplazmalı farklı büyüklük ve şekilde hücreler olarak gözlemlendi.(ok= farklı büyüklükteki EAT hücrelerini göstermektedir. (H&E 40X)

4.2.1. Böbrek Dokusu

Sağlıklı kontrol grubuna ait böbrek dokularında bağ dokusu kapsülü normal görünmekte olup, böbrek parankiması, renal korpuskülleri, proksimal ve distal tübüller, peritübüler kapillerler normal histolojik bulgular göstermekteydi (Şekil 4.3.a). Tümör kontrol grubunda bağ dokusu kapsülüne tutunmuş şekilde EAT hücreleri gözlemlendi. Bu gruba ait

böbrek kesitleri incelendiğinde, dokunun kapsülüne invaze tümör hücrelerinin farklı yoğunluklarda olduğu tespit edildi (Şekil 4.3.b ve Şekil 4.4). 25mg/kg curcumin grubunun böbrek kapsülünde tümör kontrol grubunda gözlemlenen özellikteki tümör hücrelerinin varlığı saptanmıştır, ancak EAT hücreleri tümör grubundaki hücre yoğunluğu kadar fazla değildi (Şekil 4.3.c). 50mg/kg curcumin grubuna ait dokuların bazı kesitlerinde dokunun bağ dokusu kapsülünde tümör hücresi uygulanan gruptan ve 25mg/kg curcumin uygulanan gruptan daha az kümeleşmiş EAT hücre gruplarının varlığı tespit edilirken (Şekil 4.3.d), bazı kesitlerde doku kapsülünde EAT hücresi gözlenmedi (Şekil 4.3.e).

Şekil 4.3. Böbrek dokusunda sağlıklı kontrol grubu (histolojik), tedavi ve tümör uygulama gruplarına ait (histopatolojik) bulgular (H&E, 20X). **a)** Sağlıklı kontrol grubu. **b)** Tümör kontrol grubu **c)** Tümör ve 25mg/kg curcumin uygulanan grup. **d)** Tümör ve 50mg/kg uygulanan grup. **e)** Tümör ve 50 mg/kg curcumin uygulanan grup (H&E, 10X)

Şekil 4.4 50mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda böbrek dokusunda oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü. (H&E 40X). ok=böbrek kapsülüne invaze EAT hücreleri.

4.2.2. Karaciğer dokusu

Histolojik değerlendirmeler sonucunda sağlıklı kontrol grubuna ait elde edilen karaciğer dokularında normal parankimal yapıya ait özellikler gözlenmiştir. Bu grupta, lobüller içerisinde vena centralis etrafında ışınal tarzda ilerleyen karaciğer hücreleri normaldi. Karaciğer sinüzoidlerinin ise hepatosit kordonları arasında normal olarak uzandığı gözlenmiştir. Portal alanlarda bağ dokusu içerisinde yer alan safra kanalı, hepatik arter ve ven yapıları belirgindi (Şekil 4.5a). Tümör kontrol grubuna ait karaciğer dokularında glisson kapsülünü oluşturan bağ dokusu tabakasına tutunmuş belirgin ve çok sayıda EAT hücresinin bulunduğu gözlenirken (Şekil 4.5b ve Şekil 4.6), Tümör ve 25mg/kg curcumin uygulanan grupta karaciğer dokusu kapsülünde bağ dokusuna tutunmuş şekilde EAT hücrelerinin varlığı gözlendi (Şekil 4.5c). Tümör ve 50mg/kg curcumin verilen grupta doku kapsülünde EAT hücrelerinin çok az bulunduğu hatta bazı kesitlerde hiç bulunmadığı gözlenmiştir (Şekil 4.5d).

Şekil 4.5. Karaciğer dokusunun sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları (H&E, 20X). **a)** Sağlıklı kontrol grubu **b)** Tümör kontrol grubu. **c)** Tümör ve 25mg/kg curcumin uygulanan grup. **d)** Tümör ve 50mg/kg curcumin uygulanan grup.

Şekil 4.6. Tümör kontrol grubunda karaciğer dokusunda oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü. (H&E 40X). ok=Karaciğer dokusunun kapsülüne invaze EAT hücrelerini göstermektedir.

4.2.3. Mide dokusu

Deney gruplarına ait mide dokusunun histopatolojik değerlendirmelerine ait bulgular (Şekil 4.7 ve Şekil 4.8)'de gösterilmiştir. Sağlıklı grupta histolojik bulgularda mide bezleri az dallanan basit tübüler bez yapısı göstermektedir. Bu bezler lümeninden itibaren lamina propriaya kadar uzanmaktadır. Tunika muskularisin içten dışa oblik, sirküler ve longitudinal seyreden üç tabakalı düz kas liflerinden oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 4.7a). Tümör kontrol grubunda tunika seroza tabakasına tutunmuş iri hiperkromatik nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı ve farklı morfolojik özelliklere sahip EAT hücrelerinin invaze olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.7b). Tümör ve 25mg/kg curcumin verilen grupta mide bezlerinde yapısal bir bozulmanın bulunmadığı ve seroza tabakasında EAT hücre kümelerinin sadece tümör uygulanan gruba oranla daha az olduğu belirlenmiştir. (Şekil 4.7c). Tümör ve 50mg/kg curcumin uygulanan grupta 25mg/kg curcumin uygulanan gruba oranla tunika seroza tabakasında, daha az EAT hücrelerinin varlığı gözlenmiş olup bu gruba ait dokuların mide bezlerinin yapısı sağlıklı gruba benzemektedir (Şekil 4.7d). Tümör ve 50mg/kg curcumin uygulanan gruptaki bazı mide dokularında tunika seroza tabakasına invaze EAT hücresi gözlenmedi (Şekil 4.7e).

Şekil 4.7. Mide dokusunun sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarına ait (histopatolojik) bulgular (H&E, 20X). **a)** Sağlıklı kontrol grubu **b)** Tümör kontrol grubu (H&E, 10X). **c)** Tümör ve 25mg/kg curcumin uygulanan grup. **d)** Tümör ve 50mg/kg uygulanan grup. **e)** Tümör ve 50mg/kg curcumin ve uygulanan grup.

Şekil 4.8. 25 mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda mide dokusunun kapsülünde oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü. (H&E 40X). ok=mide dokusunun kapsülüne invaze EAT hücrelerini göstermektedir.

4.2.4. Dalak dokusu

Deney gruplarına ait dalak dokuları histopatolojik olarak incelendiğinde, sağlıklı grupta histolojik incelemeler sonrasında organın dıştan fibromusküler bağ dokusu ile kaplı olduğu gözlenmiştir. Dalağa ait histopatolojik görüntüler (Şekil 4.9 ve Şekil 4.10)'da gösterilmiştir. Bu grupta, dalak genel yapısal özelliği olan trabekülalar, sinuslar ve splenik kordonları içeren kırmızı pulpa ve kırmızı pulpa içerisinde beyaz pulpa olarak adlandırılan lenf foliküllerini sergilemekteydi (Şekil 4.9.a). Tümör kontrol grubunda doku kapsülü etrafında kümelenmiş olarak bulunan EAT hücre toplulukları gözlenmiş olup doku kapsülü boyunca tümör hücrelerinin varlığı belirlenmiştir. (Şekil 4.9b). Tümör ve 25mg/kg curcumin uygulanan grupta tümör kontrol grubunda olduğu gibi EAT hücrelerinin kümelenmediği gözlenmiştir. (Şekil 4.9c) Tümör ve 50mg/kg curcumin ve uygulama grubunda, organ kapsülünde belirgin EAT hücresi yoktu. (Şekil 4.9d)

Şekil 4.9. Dalak dokusu sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarında (histopatolojik) bulgular (H&E, 20X). **a)** Sağlıklı kontrol grubu **b)** Tümör kontrol grubu **c)** Tümör ve 25mg/kg curcumin uygulanan grup **d)** Tümör 50mg/kg curcumin uygulanan grup.

Şekil 4.10. Tümör kontrol grubunda dalak dokusunun kapsülünde oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü. (H&E 40X). ok=dalak dokusunun kapsülüne invaze EAT hücrelerini göstermektedir

4.2.5. Kalın Bağırsak Dokusu

Mevcut çalışmada, histopatolojik değerlendirme için deney sonunda kalın bağırsağın proksimal, orta hat ve distal bölgesinden olacak şekilde farklı bölgelerinden dokular alınmıştır (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12) Kalın bağırsak dokusuna ait bütün bölümlerde sağlıklı kontrol grubuna ait kesitler incelendiğinde, organın tunika mukoza, tunika submukoza, tunika muscularis ve tunika seroza normal histolojik özellik göstermekteydi (Şekil 4.11a). Tümör kontrol grubunda kalın bağırsak dokusunda en dış tabakası olan tunika seroza'ya invaze olmuş değişik yoğunlukta tümör hücrelerinin varlığı saptanmıştır (Şekil 4.11b). Tümör ve 25 mg/kg curcumin uygulanan grupta, incelenen dokularda histopatolojik bulgular tümör kontrol grubu ile aynı bulguları göstermiştir. Bu grupta tümör kontrol grubuna benzer şekilde fakat daha az oranda anormal hücre yığınlarının tunika seroza'ya invaze olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.11c). Tümör ve 50 mg/kg curcumin uygulanan gruptan alınan dokularda 25 mg/kg curcumin uygulanan gruba göre tunika seroza'da daha az EAT hücrelerinin olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.11d).

Şekil 4.11. Kalın bağırsak dokusunun orta hattından alınan sağlıklı kontrol (histolojik) ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları (H&E, 20X). **a)** Sağlıklı kontrol grubu **b)** Tümör kontrol grubu **c)** Tümör ve 25 mg/kg curcumin uygulanan grup **d)** Tümör ve 50 mg/kg curcumin uygulanan grup.

Şekil 4.12.Kalın bağırsak dokusunun orta hattından 25mg/kg curcumin verilen tedavi grubundan alınan kesitteki dokunun tunika seroza tabakasında oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü. (H&E 40X). ok=Kalın bağırsak dokusunda görülen EAT hücrelerini göstermektedir.

4.2.6. İnce bağırsak dokusu

Yapılan çalışmada, histopatolojik değerlendirme için deney sonunda ince bağırsağın proksimal, orta hat ve distal bölgesinden olacak şekilde farklı bölgelerinden dokular alındı (Şekil 4.13, Şekil.4.14). Sağlıklı deney grubunda normal histolojik bulgular gözlemlendi (Şekil 4.13a). Tümör kontrol grubunda villusların lümenine doğru uzantıları bozulmuş ve dokuda tunika seroza etrafında EAT hücrelerinin yoğun bir şekilde kümeleşme özelliği gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu durum ince bağırsak dokusunun proksimal, orta hat ve distal bölümünden alınan dokularda da gözlemlenmiştir (Şekil 4.13b). Tümör ve 25mg/kg curcumin ve verilen grupta tümör kontrol grubu ile aynı histopatolojik bulgular belirlenmiştir (Şekil 4.13c). Tümör ve 50mg/kg curcumin verilen gruptan alınan dokular ile tümör kontrol grubuna ait ince bağırsak proksimal, orta hat ve distal bölgede gözlemlenen histopatolojik bulgular benzer olarak gözlemlenmiştir. Bu gruba ait dokularda tunika serozayı oluşturan gevşek bağ dokusu içinde tek tek invaze EAT hücrelerinin varlığı belirlenmiştir (Şekil 4.13d).

Şekil 4.13. İnce bağırsak dokusunun proksimal bölümüne ait sağlıklı kontrol (histolojik), tümör kontrol ve tedavi gruplarının (histopatolojik) bulguları (H&E, 20X). **a)** Sağlıklı deney grubu. **b)** Tümör kontrol grubu **c)** Tümör ve 25mg/kg curcumin verilen grup **d)** Tümör ve 50mg/kg curcumin verilen grup.

Şekil 4.14. 25mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda ince bağırsak dokusundaki histopatolojik bulgular. Proksimal hattan alınan kesitteki dokunun tunika seroza tabakasında oluşan EAT hücrelerinin görüntüsü. (H&E 40X). ok=İncebağırsak dokusunda görülen EAT hücrelerini göstermektedir.

4.3. Curcumin ekstraktının in vivo sitotoksitesisi

Deney sonunda gruplardan intraperitoneal sıvı alınarak tripan mavisi ile boyandı ve 1 ml'deki EAT hücreleri sayılarak hesaplandı. Deney sonrasında tümör kontrol grubundan 10 adet hayvandan intraperitoneal sıvı elde edilirken, tedavi gruplarından 25mg/kg curcumin verilen gruptan 6 hayvandan, 50mg/kg curcumin verilen gruptan ise 4 hayvandan intraperitoneal sıvı elde edildi. Alınan bu sıvılardaki EAT hücreleri sayılarak aritmetik ortalaması Tablo 4.3'de verilmiştir. Deneyimizde tedavi gruplarında daha az hayvandan intraperitoneal sıvı alındığı için kontrol grubu ile istatistiksel bir karşılaştırma yapılamadı.

Tablo 4.3. Deney gruplarında EAT hücrelerinin ortalama sayısı

Grup No	Ortalama Canlı Hücre Sayısı (ml)
Sağlıklı kontrol grubu n=10	-
Tümör kontrol grubu n=10	54.40x10 ⁶
Tümör ve 25mg/kg curcumin grubu n=6	37.66x10 ⁶
Tümör ve 50mg/kg curcumin grubu n=4	30.40x10 ⁶

4.4. Deney süresince solid tümör gruplarının vücut ağırlık değişimleri

Deneyel çalışmanın başlangıcında ense bölgelerinden subkutan yolla 1×10^6 EAT hücresi bulunan 0.1 ml asit sıvısı enjekte edilen farelerde, 5.günde tümör kitlesi elle palpe edilebilir boyuta ulaşmıştı. 7. günde tümör hacmi ölçülebilir boyuta gelmişti. 15. günün sonunda deney grubundaki farelerde tümör dokularının farklı boyutlarda olduğu gözlemlendi (Resim 4.3). 15 günlük deney süresince kontrol ve tedavi gruplarındaki hayvanların ortalama vücut ağırlıkları ölçüldü ve değerler Tablo 4.4’de verilmektedir. Tümör hücresi verilen kontrol grubunun ilk gün ortalama ağırlığı 28.84g olarak ölçülürken, son gün kontrol grubunun ortalama ağırlığı 37.17 g olmuştur. Tedavi grubundan biri olan 25 mg/kg curcumin grubunun ilk gün ortalama ağırlığı 29.34 g, son gün tedavi grubunun ortalama ağırlığı 33.01 g olarak ölçülmüştür. Diğer tedavi grubu 50mg/kg curcumin uygulanan grupta ise ilk gün ortalama ağırlık 28.35 g, son gün ortalama ağırlığı ise 32.98 g olarak ölçülmüştür (Tablo 4.4). 15 günlük çalışma süresince, hem kontrol hem tedavi grubundaki hayvanların 1. güne göre vücut ağırlığındaki değişimler Tablo 4.5 ’ de verilmektedir.

Resim 4.3. Ehrlich solid tümörünün görünümü ve tümör boyutlarının ölçümü (ok=Ehrlich solid tümörü)

Tablo 4.4. Kontrol ve tedavi grubuna ait farelerin vücut ağırlıklarının 1-15 gün aralığında değişimi. Ağırlıklar ortalama $\pm$ standart sapma olarak verilmiştir.

Günler	Negatif Kontrol	Tümör Kontrol	25mg/kg Curcumin	50mg/kg Curcumin
	ORT. $\pm$ SS.	ORT. $\pm$ SS.	ORT. $\pm$ SS.	ORT. $\pm$ SS.
1.gün	28.69 $\pm$ 3.25	28.84 $\pm$ 1.55	29.34 $\pm$ 1.54	28.35 $\pm$ 1.55
2. gün	29.67 $\pm$ 2.37	28.97 $\pm$ 1.42	29.29 $\pm$ 1.70	28.59 $\pm$ 1.65
3. gün	29.63 $\pm$ 2.47	29.43 $\pm$ 1.34	28.59 $\pm$ 1.67	28.01 $\pm$ 2.41
4.gün	29.59 $\pm$ 1.80	31.37 $\pm$ 1.27	28.79 $\pm$ 1.66	28.39 $\pm$ 2.40
5.gün	30.03 $\pm$ 1.58	33.70 $\pm$ 1.07	29.83 $\pm$ 1.28	29.21 $\pm$ 2.31
6.gün	30.32 $\pm$ 1.59	34.58 $\pm$ 1.16	30.05 $\pm$ 0.96	29.49 $\pm$ 1.93
7. gün	31.26 $\pm$ 1.84	35.31 $\pm$ 0.97	30.40 $\pm$ 1.12	30.73 $\pm$ 1.91
8. gün	31.14 $\pm$ 1.71	35.59 $\pm$ 0.91	31.16 $\pm$ 0.70	30.66 $\pm$ 1.67
9. gün	31.57 $\pm$ 1.47	35.68 $\pm$ 0.74	31.08 $\pm$ 0.94	30.84 $\pm$ 1.77
10.gün	31.62 $\pm$ 1.82	36.31 $\pm$ 0.89	31.55 $\pm$ 0.52	31.17 $\pm$ 1.86
11. gün	32.46 $\pm$ 1.68	36.38 $\pm$ 0.65	32.24 $\pm$ 0,82	32.58 $\pm$ 1.85
12. gün	32.89 $\pm$ 1.81	36.65 $\pm$ 0.76	33.16 $\pm$ 0,93	29.92 $\pm$ 10.64
13. gün	32.14 $\pm$ 1.78	36.15 $\pm$ 2.05	32.25 $\pm$ 1.02	32.40 $\pm$ 1.66
14. gün	32.41 $\pm$ 1.54	37.08 $\pm$ 0.86	32.70 $\pm$ 1.07	32.53 $\pm$ 1.65
15. gün	32.52 $\pm$ 1.48	37.17 $\pm$ 0.90	33.01 $\pm$ 1.20	32.98 $\pm$ 1.35

Tablo 4.5. Gruplar arasında birinci gün ile diğer günler arasındaki vücut ağırlıklarının ortalama değişimi

Gün	Negatif Kontrol grubu kilogram $\pm$ SS (n=10)	Tümör Kontrol grubu kilogram $\pm$ SS (n=10)	Tedavi grubu 25mg/kg Curcumin kilogram $\pm$ SS (n=10)	Tedavi grubu 50mg/kg Curcumin kilogram $\pm$ SS (n=10)
1-2	0.03 $\pm$ 0.05	0.04 $\pm$ 0.03	-0.02 $\pm$ 0.04	0.00 $\pm$ 0.03
1-3	0.03 $\pm$ 0.05	0.02 $\pm$ 0.02	-0.02 $\pm$ 0.03	-0.01 $\pm$ 0.06
1-4	0.03 $\pm$ 0.06	0.08 $\pm$ 0.03	-0.02 $\pm$ 0.03	-0.00 $\pm$ 0.06
1-5	0.04 $\pm$ 0.06	0.14 $\pm$ 0.04	0.01 $\pm$ 0.03	0.02 $\pm$ 0.05
1-6	0.05 $\pm$ 0.06	0.16 $\pm$ 0.04	0.02 $\pm$ 0.04	0.03 $\pm$ 0.03
1-7	0.08 $\pm$ 0.07	0.18 $\pm$ 0.05	0.03 $\pm$ 0.07	0.07 $\pm$ 0.03
1-8	0.08 $\pm$ 0.07	0.18 $\pm$ 0.04	0.05 $\pm$ 0.04	0.07 $\pm$ 0.03
1-9	0.09 $\pm$ 0.07	0.19 $\pm$ 0.03	0.05 $\pm$ 0.03*	0.08 $\pm$ 0.03
1-10	0.09 $\pm$ 0.07	0.20 $\pm$ 0.05	0.07 $\pm$ 0.04	0.08 $\pm$ 0.03
1-11	0.11 $\pm$ 0.06	0.20 $\pm$ 0.04	0.08 $\pm$ 0.04	0.01 $\pm$ 0.04*
1-12	0.12 $\pm$ 0.07	0.21 $\pm$ 0.04	0.11 $\pm$ 0.04	0.13 $\pm$ 0.04
1-13	0.10 $\pm$ 0.08	0.19 $\pm$ 0.08	0.08 $\pm$ 0.04	0.12 $\pm$ 0.05
1-14	0.11 $\pm$ 0.08	0.22 $\pm$ 0.03	0.10 $\pm$ 0.05	0.12 $\pm$ 0.05
1-15	0.11 $\pm$ 0.08	0.22 $\pm$ 0.03	0.11 $\pm$ 0.05	0.13 $\pm$ 0.05

Kontrol ile karşılaştırıldığında *p<0.05. Yüzde değişimi = (Son gün-İlk gün)/Son gün.

4.4.1. Deney süresince solid tümör gruplarının tümör hacim değişimleri

Kontrol ve tedavi gruplarında tümör büyüklüğü deri yüzeyinden tümör hacminin ölçülebildiği günden itibaren kaydedildi. Tümör kontrol grubunda 7. günden itibaren ölçülmeye başlanırken bu ölçümler tedavi gruplarında 8. günden itibaren ölçülebildi. Tüm hayvanlardaki tümör büyüklüklerinin tamamı kendi aralarında hacimsel olarak karşılaştırıldı ve bu karşılaştırmaya ait bulgular (Tablo 4.6)'da verildi. Her grupta hacim artışı gözlenirken kontrol grubunun ortalama hacmi son gün 4603.99 mm³, 25mg/kg curcumin verilen tedavi grubunun ortalama hacmi son gün 1179.56 mm³. 50mg/kg curcumin verilen tedavi grubunun son gün hacmi 2059.12 mm³ olarak ölçüldü.

Tablo 4.6. Gruplar arası solid tümör hacimlerinin günlere göre karşılaştırılması

Gün	Tümör kontrol Grubu (n=10) Medyan (%25 – 75)	Tedavi Grubu 25mg/kg Curcumin (n= 10) Medyan (%25 – 75)	Tedavi Grubu 50mg/kg Curcumin (n= 10) Medyan (%25 – 75)	p
7	60.42(49.29–110.71)	-	-	-
8	212.13(52.11–376.16)	72.54(19.02-354.76	159.98(39.85-195.49)	0.614
9	384.57(253.49-762.10)	138.07(77.79-263.49)	309.62(142.49-482.17)	0.118
10	1127.99(345.56-2156.91)	388.91(282.76-415.76)*	604.96(195.70-875.25)*	0.011
11	1763.52(514.33–2574.21)	478.30(335.68-677.29)*	1379.30(497.122451.48)*	0.008
12	1746.88 (494.36–3161.91)	606.99(341.79-773.41)*	1162.43(462.502303.32)*	0.008
13	2728.83(1363.49–3881.40)	810.26(477.03-1323.69)*	1857.10(639.812447.20)*	0.008
14	4086.90(2093.69–8049.06)	969.56(579.21-1669.80)*	2112.84(859.812864.16)*	0.006
15	4603.99(3196.06–8049.06)	1179.56(607.81-1910.22)*	2059.12(855.162059.12)*	0.006

Kontrol ile karşılaştırıldığında *p<0.05.

4.5. Apoptotik Bulgular

Çalışmada, apoptotik hücreler TUNEL metodu ile belirlendi ve TUNEL pozitif hücreler yeşil flouresan yansıma ile gösterildi. Deney gruplarından elde edilen solid tümör doku kesitleri incelendiğinde, apoptotik hücrelerin tümör dokusunun geneline dağıldığı gözlemlendi (Şekil 4.15). Kesitlerden alınan fotoğraflar üzerinde yapılan sayım sonrasında istatistiksel analiz sonuçlarına göre apoptotik hücre sayısı kontrol grubunda 5.455 ± 3.23 iken 25 mg/kg curcumin verilen tedavi grubunda 6.575 ± 6.57 , diğer tedavi grubu olan 50 mg/kg curcumin grubunda 7.775 ± 4.72 olarak bulundu (Tablo 4.7). Elde edilen sonuçlara göre, tedavi gruplarının her ikisinde de apoptotik hücre sayısında belirgin bir artış gözlemlendi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlendi (p <0.05).

Tablo 4.7. Gruplar arası apoptotik hücre sayılarının karşılaştırılması

	Tümör Kontrol grubu	Tedavi 25 mg/kg Curcumin	Tedavi 50 mg/kg Curcumin
Tunel Pozitif Hücre sayısı (n=120)	5.455±3.23	6.575±6.57*	7.775±4.72*
Min–max değeri	0-15	0-22	0-21

Kontrol ile karşılaştırıldığında *p<0.05. Veriler ortalama $\pm$ standart sapma olarak ifade edildi.

Şekil 4.15. Deney gruplarına ait apoptotik hücreler **a-c)** Kontrol grubuna ait apoptotik hücreler **d-f)** Tedavi grubuna (25mg/kg curcumin) ait apoptotik hücreleri **g-i)** Tedavi grubuna (50mg/kg curcumin) ait apoptotik hücreler. Ok=apoptotik hücreler. Ölçek çubuğu=100µm

4.6. Anjiogenezis Bulguları

Deney sonunda, kontrol ve tedavi gruplarında oluşturulan tümör dokularından alınan kesitlerde Faktör VIII ekspresyonunun belirlenmesi için immünohistokimyasal boyama prosedürü uygulandı. Gruplara ait dokulardan elde edilen kesitlerde Faktör VIII ile belirlenen ortalama damar yoğunluğu Tablo 4.8’de gösterilmiştir. Faktör VIII için yapılan immünohistokimyasal boyama ile kontrol ve tedavi gruplarına ait kesitlerdeki damar endotel hücrelerinde pozitif boyanma gözlemlendi (Şekil 4.16). Tümör dokusuna ait

nekrotik bölgeler değerlendirmeye alınmadı. Gruplar arasındaki damar yoğunluğuna bakıldığında kontrol grubunda ortalama damar yoğunluğu 6.033 olarak hesaplanırken, tedavi gruplarından 25mg/kg curcumin uygulanan grupta ortalama damar yoğunluğu 3.000, 50mg/kg curcumin uygulanan grupta ise 1.866 olarak hesaplandı. Gruplar Faktör VIII ekspresyon yoğunluğu açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlendi ($p<0.05$). (Tablo 4.8). Negatif kontrol olarak boyanan kesitte Faktör VIII immunoreaktivitesi gözlenmedi.

Tablo 4.8. Faktör VIII'in damar yoğunluğunun deney grupları arası karşılaştırılması

	Tümör Kontrol	Tedavi 25 mg/kg	Tedavi 50 mg/kg
Damar yoğunluğu (F8) (n=30)	6.033±2.14	3.000±2.05*	1.866±1.45*
Min-max değeri	2-11	0-8	0-5

Kontrol ile karşılaştırıldığında * $p<0.05$. Veriler ortalama $\pm$ standart sapma olarak ifade edildi.

Şekil 4.16. Deney gruplarına ait damar yoğunlukları **a)** Negatif kontrol grubu, **b)** Tümör kontrol grubu, **c)** Tedavi grubu 25mg/kg curcumin **d)** Tedavi grubu 50mg/kg curcumin damar endotelinde Faktör VIII'in ekspresyonu (ok= Faktör VIII pozitif kapiller). 40X. Ölçek çubuğu =100µm.

4.7. EAT hücreleri üzerine uygulanan curcumin ekstraktının invitro etkisi

Deneyde 10µg/ml, 20µg/ml ve 30µg/ml olarak hesaplanan curcumin dozları kullanıldı. EAT hücreleri üzerine eklenen curcumin dozlarının 3 ve 24 saatlik inkübatörde bekletilme süresi sonrasında hücre sayımı bulguları değerlendirildi. Yapılan *in vitro* deney sonrasında gruplarda hesaplanan canlı ve ölü hücre sayıları ortalama değer ve standart sapma olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 4.9). EAT hücreleri sayımı sonrasında canlı ve ölü hücreler görüntülendi Şekil 4.17 ve Şekil 4.18.

Şekil 4.17. *In vitro* deney gruplarında 3 saatlik canlı ve ölü EAT hücrelerinin thoma lamı üzerindeki görüntüleri. **Ok**=Canlı EAT Hücreleri, **yıldız**=Ölü EAT Hücreleri. **a)** Tümör kontrol grubu EAT hücrelerinin görüntüleri. **b)** 10µg/ml curcumin uygulanan EAT hücreleri. **c)** 20µg/ml curcumin uygulanan EAT hücreleri. **d)** 30µg/ml curcumin uygulanan EAT hücrelerinin görüntüsü. 20X. Ölçek çubuğu =50µm.

Şekil 4.18. *In vitro* deney gruplarında 24 saatlik canlı ve ölü EAT hücrelerinin thoma lamı üzerindeki görüntüleri. **Ok**=Canlı EAT hücreleri, **yıldız**=Ölü EAT hücreleri. **a)** Tümör kontrol grubu EAT hücrelerinin görüntüleri. **b)** 10µg/ml curcumin uygulanan EAT hücreleri. **c)** 20µg/ml curcumin uygulanan EAT hücreleri. **d)** 30µg/ml curcumin uygulanan EAT hücrelerinin görüntüsü. 20X. Ölçek çubuğu =50µm.

Tablo 4.9. *In vitro* deney gruplarında hesaplanan ortalama canlı ve ölü hücre değerleri

	Tümör Kontrol ort hücre sayısı ± SS	Tedavi 10µg/ml curcumin ort hücre sayısı±SS	Tedavi 20 µg/ml curcumin ort hücre sayısı±SS	Tedavi 30µg/ml curcumin ort hücre sayısı±SS
Canlıhücre (3saatlik)	5.79±0.20	5.81±1.16	5.70±0.15	5.73±0.16
Ölü hücre (3saatlik)	5.63±0.19	5.79±0.20	5.62±0.19	5.69±0.20
Canlıhücre (24saatlik)	5.69±0.19	5.60±0.16	5.64±0.15	5.50±0.15
Ölü hücre (24saatlik)	3.98±2.43	4.66±1.80	3.84±2.06	3.91±2.30

Üç saatlik sayım sonrasında tümör kontrol ve tedavi grupları arasında yapılan canlı ve ölü hücre sayımında pozitif kontrol ve 10µg/ml curcumin ($p<0.025$) ile 10µg/ml ile 20µg/ml curcumin ($p<0.037$) verilen gruplar arasında yapılan sayım istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. *In vitro* deney gruplarında 24 saat süre ile inkübatörde bekletilen gruplar arasında yapılan canlı ve ölü EAT hücreleri sayımında 30µg/ml curcumin ile 10µg/ml ($p<0,08$), 30µg/ml curcumin ile 20µg/ml curcumin ve pozitif kontrol ile 30µg/ml curcumin grubu arasında yapılan sayım istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.001$).

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Kanser, tümörleri oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve hızla yayılması ile karakterize edilen ve çoğunlukla çevre dokulara yayılması nedeniyle ölümlü sonuçlanan bir hastalıktır (5). Ölümlere neden olan kanser türlerinin erkeklerde ve kadınlarda görülme sıklığı farklılıklar göstermektedir. Akciğer kanserleri her iki cinsten, prostat kanseri erkeklerde, meme kanseri ise kadınlarda sık görülen ve zaman zaman ölümlü sonuçlanan kanser türleridir (102,103). Kanser hastalarına genel olarak bakıldığında erişkin hastalarda kanser vakalarında hayatta kalma oranı 1960'lerde %39 iken 1990'lerde bu oran %60'a yükselmiştir. Kanser olgularında yıllar içerisinde hayatta kalma oranındaki artışın sebebi kanser tedavilerinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapinin hastalara birlikte uygulanması olarak ifade edilmektedir. Hastalara uygulanan cerrahi girişimdeki amaç vücutta kontrolsüz bir şekilde oluşan tümörlü dokunun uzaklaştırılması diğer uygulanan tedavilerde amaç ise kanser hücrelerinin öldürülerek yok edilmesidir (21,104,105). Son yıllarda kanser tedavisinde yukarıda belirtilen tedavilere ek olarak tamamlayıcı tıptan da faydalanılmaktadır. Bazı bitkilerin kanser tedavisinde faydalı olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Çeşitli ülkelerde halk tarafından kullanılan bitkiler, sebzeler, kanser kemoterapisinin ilerlemesine ışık tutmuştur (106). Bu bitkilerden bazılarının ihtiva ettiği doğal kimyasalların (kırmızı üzümdeki resveratrol, soyadaki genistein ve zerdeçaldaki curcumin gibi) kanseri önleyici özellikleri olduğunu göstermiştir (20).

Zerdeçal (*curcuma longa*, turmerik, Hint safranı), Çin ve Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilen zencefil ailesine ait sarıçiçekli, büyük yapraklı ve yumrulu bir bitkidir. Zerdeçal kullanımı çeşitli hastalıklar için tedavi edici bir ajan olarak etkili olduğu

bulduğundan bu yana, curcumin ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Curcumin daha önce Hint tıbbında deri hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Anti inflamatuvar ve antimikrobiyal ajan olarak kullanımı Çin'de ve Hindistan'da yaygındır (107,108). Curcumin ve kanser ile ilgili yapılan çalışmalarda curcuminin kanser hücrelerinin ölümünü hızlandırdığı ve tümör hücrelerinin bölünmesini durdurduğu bilinmektedir (109). Curcuminin kanser hücreleri üzerindeki anti kanserojen özelliği bu bitki ile ilgili araştırmaları artırmış ve değişik kanser modeli üzerinde denenmesine sebep olmuştur (8,21).

Günümüzde kanser üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı kanser biyolojisini ortaya koyup, tedavi yollarını bulmak ve geliştirmek için yapılmaktadır. Kanser üzerinde yapılan çalışmalarda geliştirilmiş kanser modelleri ve tümörlerden elde edilen hücre hatları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu modellerden biri de EAT modelidir. EAT deneysel olarak oluşturulan hayvan tümörlerinden biri olmakla beraber pek çok araştırmaya konu olmuştur. İlk defa dişi bir farede spontan meme adenokarsinoması olarak gelişmiş olan EAT Ehrlich ve Apolant (1905) tarafından tümör hücreleri fareden fareye subkutan transplante edilerek deneysel tümör modellerinde kullanılır hale getirilmiştir (59,60). EAT ile ilgili çalışmaların bir kısmı kanser dokuları üzerine etkisi olabilecek tedavi amaçlı kullanılan bitkilerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalardır (12).

Birçok deneysel kanser modeli üzerine bazı bitkilerin ve şifalı otların kanser hücreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında bu bitkiler içerisinde curcumin olası anti kanserojen etki bakımından ümit vaad eden bir bitkidir. Farklı kanser modellerinde curcumin ekstraktının farklı dozlardaki etkileri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Kanter ve ark. (110) gamma radyasyona bağlı oluşan jejunum mukoza hasarına karşı curcumin ve amifostinn koruyucu etkilerini araştırmışlardır ve yüksek doz radyasyonda curcumin'in etkinliğinin azaldığını belirtmişlerdir. Lopez (111) çalışmasında 20µg/ mL dozda curcuminin K-562 insan kronik miyelojen lösemi hücrelerinde büyümeyi %50 oranında durduğunu göstermişlerdir Pan ve ark. (112) Farelerde Alzheimer modeli oluşturularak curcumin'in tedavi edici etkisi üzerinde çalışmışlardır. Hipokampusları incelenen farelerde Bax seviyelerinin değişmediğini çalışmalarında belirtmişlerdir Yu-Wen ve ark. (113) farelerde deneysel olarak oluşturulmuş akut pankreatit olgusunda curcuminin önleyici

etkisini arařtırmıřlar ve 6 gn boyunca 50mg/kg/gn olarak intraperitoneal curcumin enjeksiyonu yapmıřlardır. Deney sonrasında pankreastaki hasarın azaldıđını ve serum amylase seviyesinin arttıđını bildirmıřlerdir. Ueki ve ark. (114) cisplatin ile uyarılmıř renal inflamasyonu olan farelerdeki curcuminin dzenleyici etkisini arařtırmıřlar, cisplatin ile birlikte curcumin (100mg/kg) verdikleri grupta serum TNF konsantrasyonunun %30 azaldıđını, sadece curcumin (50mg/kg) verdikleri grupta ise serum TNF dzeyinin %10 olarak belirlediklerini ve renal fonksiyonların bozukluđunda azalma olduđunu belirtmiřlerdir. Bhaumik ve ark. (56) alıřmalarında AK-5 tmr hcreleri zerine curcumin etkileri arařtırılmıř kontrol grubunun hepsinde peritoneal blgede gzle grlr bir řiřkinlik meydana geldiđi ve 10. gnn sonunda deney grubunda %90 lm olduđu bildirilmiřtir. Curcumin verilen grupta ise peritoneal řiřkinlik oranının %80 olarak belirlendiđi ve gruptaki hayvanlar 40. gnden sonraya kadar hayatta kaldıkları bildirilmiřtir. Curcumin 10µM konsantrasyonda apoptozu 4. saat sonunda %40, 18'inci saat sonunda %100 olarak artırdıđını alıřmalarında belirtmiřlerdir.

Pan ve ark. (44) alıřmalarında farelerde curcuminin biyotransformasyonuna bakmıřlar ve curcumin dozunu farelere 0.1 gr/kg intraperitoneal olarak Limtrakul ve ark. (51) yapmıř oldukları alıřmalarında curcumini farelere oral olarak vermiřlerdir. Bunun iin farelerin yemlerine 115 mg/kg/gn dozunda curcumin ekleyerek 3 ay sre ile farelere curcumin dozunu gnlk olarak vermiřlerdir. 3 aylık sre sonrasında curcumin dozunun toksik deđerlere ulařmadıđını ve farelerde oluřan kanserli hcrelerde apoptozisi indklediđini alıřmalarında belirtmiřlerdir Aktař ve ark. (115) diři farelerde iyonize radyasyona maruz bırakmadan nce 10 gn boyunca farelerin diyetlerine 100mg/kg curcumin eklemiřler ve deney sonunda radyasyona bađlı ovaryum folikllerinde curcuminin folikler atreziyi engellediđini rapor etmiřlerdir Srimal ve ark. (116) ratlarda yapmıř oldukları curcuminin antiinflamatuvar etkisinin arařtırmıřlar ve oral olarak verilen curcuminin (160mg/kg) inflamasyonun gerilemesinde etkili olduđunu belirtmiřlerdir Zunino ve ark. (117) yapmıř oldukları lenfoblastik lsemide oral ve parenteral curcuminin 4 farklı dozunu (5, 10, 25, 50mg/kg) alıřmıřlar ve lsemide 10 ve 25mg/kg curcumin dozunu etkin bulmuřlardır.

Yukarıda belirtilen alıřmalarda 10 ile 160mg/kg dozlarındaki curcuminin oral, intraperitoneal ve parenteral yollarla uygulandıđında genel olarak kanserli dokularda

etkin olduđu rapor edilmiştir. Mevcut çalışmada EAT hücreleri intraperitoneal verilerek asit tümör, subkutan verilerek solid tümör grupları oluşturulmuş ve curcuminin literatürde belirtilen doz sınırları içinde 25mg/kg/gün ve 50mg/kg/gün dozları intraperitoneal enjekte edilerek EAT hücreleri üzerindeki antimetastatik etkileri araştırılmıştır. In vitro çalışmalar için ise 10µg/ml, 20µg/ml ve 30µg/ml curcumin dozları kullanılmıştır.

Ceylan'ın (118) yapmış olduđu çalışmada EAT hücreleri ile farelerde oluşturulan deneysel kanser üzerine gilaburu (*Viburnum opulus*) meyve suyunun etkilerini araştırmış ve tümör kontrol grupta karaciğer ve böbrek dokusunda EAT hücrelerinin metastas yaptığını, tedavi gruplarında da metastas olduğunu ancak EAT hücre topluluklarının doku kapsülü etrafında tümör kontrol grubu kadar yoğun olmadığını rapor etmiştir. Facchini ve ark. (119) yapmış oldukları çalışmalarında *Pleurotus ostreatus*'a ait (mantar türü) polisakkarit fraksiyonlarının etkilerini intraperitoneal olarak 5×10^6 EAT hücresi verilmiş farelerde araştırmışlar ve yüksek derecede tümör inhibisyonu olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir Hanafy (120) çalışmasında EAT hücreleri enjekte edilmiş farelerde Ginger bitkisinin koruyucu etkisini araştırmışlar ve yapmış oldukları çalışmada hayvanlara intraperitoneal yolla EAT hücreleri ($2,5 \times 10^6$ hücre) enjekte etmişlerdir ve çalışmış oldukları bitkinin kanseri önlemede ve tedavisinde etkin olabileceğini vurgulamışlardır. Patra ve ark. (121) *Sargassum tenerrimum* isimli bitkinin intraperitoneal olarak EAT hücresi (2×10^6 hücre) verilen farelerdeki antitümör ve antioksidan etkisini incelemişler ve hayvanların hayatta kalma süresinin uzadığını çalışmalarında belirtmişlerdir Özaslan ve ark. (122) Ehrlich ascites tümör uygulanmış balb/c türü farelerde *Plantago majör* bitkisinin antitümöral etkisini in vivo olarak araştırmışlar ve 1×10^6 EAT hücresini intraperitoneal olarak deney gruplarına uygulamışlardır. *Plantago majör* bitkisinin EAT hücre sayısını azalttığını çalışmalarında bildirmişlerdir. Raju ve ark. (106) benzer bir çalışmada EAT taşıyan farelerde *Drosera burmannii vahl.* bitkisinin etanol ve sulu ekstrelerinin antitümör aktivitesine bakmışlar, çalışmalarında 14 gün boyunca tedavi uygulamışlar çalışma boyunca hayvan ağırlıklarında intraperitoneal hücre artışına bağlı olarak artış olduğunu bildirmişlerdir. Normal grupta hayvan ağırlığını 21.73g olarak belirlerken tümör kontrol grubunda 39.1g, tedavi gruplarında ise 23.45g, 22.83g ve 24.85 g olarak ölçmüşler.

Yukarıda verilen çalışmalardan anlaşılacağı üzere EAT modeli bitki ekstraktları, bitkilerden izole edilmiş fragment, bileşik ve ajanların *in vivo* ortamda antitümöral etkisinin çalışılabileceği uygun bir modeldir. Bu modelde periton içine enjekte edilen EAT hücrelerinin sayısı literatürde 1×10^6 ile 5×10^6 arasında değişmektedir. EAT hücreleri hızlı çoğalan bir hücre grubu olduğundan curcuminin EAT hücreleri üzerine etkilerini *in vivo* olarak daha uzun bir süre gözlemleyebilmek için çalışmamızda düşük hücre sayısı (1×10^6 EAT hücresi) deney gruplarına enjekte edilmiştir. Intraperitoneal EAT hücresi verilen gruplarda tümör kontrol ve tedavi gruplarında hayvan ağırlıklarında sağlıklı kontrollere göre bir artış gözlemlendi. Bu artışın sebebinin intraperitoneal alanda EAT hücrelerindeki artışa bağlı olduğu düşünüldü. Tümör kontrol grubuna göre 25mg/kg ve 50mg/kg curcumin uygulanan gruplarda kilo artışının daha az olduğu belirlendi. Deney sonu (10. gün) hayvanların ortalama ağırlığı sağlıklı kontrollerde 31.35g, tümör kontrol grubunda 50.30g, 25mg/kg curcumin verilen grupta 42.02g ve 50 mg/kg curcumin verilen grupta ise 40.40g olarak bulundu.

Yaptığımız çalışmada EAT hücrelerini intraperitoneal olarak verdiğimiz tümör pozitif ve tedavi gruplarından aldığımız böbrek, karaciğer, dalak mide, ince ve kalın bağırsak dokularında yapmış olduğumuz histopatolojik incelemede literatürde de belirtildiği gibi tümör kontrol grubunda doku etrafında ya da kapsül etrafında invaze iri hiperkromatik nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı farklı şekillerdeki EAT hücreleri toplulukları gözlemledik. EAT ile birlikte curcumin dozları uyguladığımız gruplarda ise yüksek doz verdiğimiz (50mg/kg curcumin) doku etrafında EAT hücreleri tümör kontrol grubundaki kadar yoğun değildi hatta bazı dokularda neredeyse yok denecek kadar az EAT hücresi gözlemledik. Bu grupta dokuların yapıları normal histolojik özellikler sergilemekteydi. 25mg/kg curcumin verdiğimiz grupta ise diğer tedavi grubuna oranlar daha fazla EAT hücresini doku kapsülünde gözlemledik. Curcuminin *in vivo* sitotoksitesine baktığımızda ise tümör kontrol grupla karşılaştırdığımızda hücre sayısının tümör kontrol gruptan daha az olduğunu gözlemledik.

Zeybek ve ark. Joseph ve ark. Ekinci ve ark. (57,123,124) yapılan çalışmalarda 1×10^6 EAT hücre süspansiyonunun konak farenin derialtına enjekte edildiğinde bir haftalık süre sonunda ölçülebilecek düzeyde solid tümör oluştuğunu bildirilmiş Ekinci ve ark. Önder ve ark. (124,125) çalışmalarında tümör dokusunun boyutlarının hayvanlarda eşit olmadığını belirtmişlerdir çalışmamızda subkutan Ehrlich tümör oluşturulan deney

gruplarına ait hayvanların ağırlıkları 15 günlük deney sonunda tümör kontrol grubunda 9 g, tedavi gruplarında ise ortalama 4 g artmış olduğu belirlendi. Son gün ortalama tümör hacmi, tümör kontrol grubunda 4603.99mm^3 , 25mg/kg curcumin uygulanan tedavi grubunda 1179.56mm^3 , 50mg/kg curcumin uygulanan diğer tedavi grubunda ise 2059.12mm^3 olarak ölçüldü. Çalışmamızda tümör dokusunda aktif ve nekrotik alanların varlığı lobüllü yapı şeklinde gözlemlendi. Lobül yapılarının merkezi kısımlarında nekrotik hücrelerin, periferik kısımlarında ise mitoz gösteren hücrelerin miktarca fazla olduğu gözlemlendi, tümör kitlesinde bu alanların görülmesi, tümörün hızlı büyümesine rağmen bu büyüme hızına damarlanmanın eşlik edemediğini ve tümör de hücre ölümlerinin ortaya çıkabildiğini göstermektedir.

Apoptoz, hücre dışı lezyonlar ya da genetik faktörlerle aktive edilen ve hücrenin kendisi tarafından programlanmış bir mekanizma ile hücre ölümünü kontrol eden, hücrenin intiharı olarak tanımlanır (70,71). Curcuminin apoptozu indükleyici etkisi araştırmacılar tarafından değişik kanser hücre hatlarında çalışılmıştır. Choudri ve ekibinin (126) curcumin uygulanan akciğer kanseri hücre hatlarında 24 ve 48 saatlik ($10\mu\text{M}$ ve $25\mu\text{M}$) tedavisi sonrasında apoptozun arttığını rapor etmişlerdir Odot ve ark. (127) B16 melanom hücrelerine karşı curcuminin *in vitro* olarak antitümöral etkisine bakmışlar ve $100\mu\text{M}$ curcumin uygulanan grupta B16 hücre ölümlerinin artmış olduğunu belirtmişlerdir. Somasundaram ve ark. İnsan meme kanseri hücresinde, Bhaumik ve ark. ise AK5 hücre hattında, Weir ve ark ovaryum kanser modeli olan p53 mAPK hattında curcuminin apoptozu artırdığını rapor etmişlerdir (56,128,129). Ayrıca Ehrlich solid tümöründe curcuminin apoptoz üzerine etkisini araştıran çalışmalarda mevcuttur. Armutak ve ark. (130) çalışmalarında Balb/C türü deneklere 3×10^6 EAT hücresini subkutan olarak enjekte ettikten sonra deneklere tedavi olarak 100mg/kg curcumin gavaj yolu ile uygulayıp apoptotik hücre sayısını ortalama kontrol grubunda 3.50, tedavi grubunda ise 1.75 olarak belirlemişlerdir. Pal ve ark. (131) 1×10^6 EAT hücresi enjekte ederek oluşturdukları tümör üzerinde tedavi olarak uygulanan $50\mu\text{M}$ curcuminin apoptozu artırıcı etkisini rapor etmişlerdir.

Mevcut çalışmada 1×10^6 EAT hücresi ile oluşturulan subkutan solid tümörler üzerine tünel boyama metodu uygulandı. Tümör kontrol grubu ile iki ayrı tedavi grubunu karşılaştırıldığında tümör kontrol grubunda apoptoza uğrayan hücre sayısı 5.455 iken tedavi gruplarından 25mg/kg curcumin uygulanan grupta 6.575, 50mg/kg curcumin

uygulanan grupta ise 7.775 olup tedavi grubundaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur $p<0.05$. Sonuçlar literatürde rapor edilen sonuçlarla uyumlu olup curcuminin deneysel kanser modellerinden biri olan EAT hücrelerinde apoptoza neden olduğunu desteklemektedir.

Anjiyogenezis büyüme gelişme esnasında normal fizyolojik bir olay iken aynı zamanda kanser hücrelerinin çoğalması ve büyümesi için de gereklidir (132). Faktör 8 endotel hücrelerde eksprese edilen önemli bir protein olup iyi ve kötü huylu lezyonların endotelial orijinli olup olmadığını belirlemek, solid tümör tipini tespit etmek ve kanserin metastaz oluşumunu tespit etmek için birim alanda gözlemlenen mikro damar yoğunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerdendir. Faktör 8'in ekspresyon yoğunluğu tümör dokusundaki vaskularizasyonunun ne derece olduğunu belirler (133,134). Kanserli dokular üzerinde yapılan çalışmalarda antikanserojen etkiye sahip olduğu düşünülen bazı maddelerin tümör damarlanmasını azalttığı ortaya konulmuştur. Geng ve ark. (135) akciğer kanseri ile ilgili yapmış oldukları çalışmada hücreler üzerine cisplatin ve deksametason uygulamışlar ve çalışmalarında tümörde meydana gelen yeni damarlanmaların azaldığını belirlemişlerdir Perassi ve ark. (136) deneysel kanser modellerinden biri olan xenograft modeli üzerine yapmış oldukları çalışmalarında melatoninin meme kanseri üzerine etkisinin araştırmışlar ve çalışmada tümör üzerinde mikrodamar yoğunluğunun ve tümör büyümesinin azaldığını aynı zamanda anjiyogenezisinde kontrol grubuna oranla daha az oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Fu ve ark. (137) yapmış oldukları çalışmada karaciğerde oluşan tümörler üzerinde 20 μ M curcumin tedavisine bağlı olarak anjiogenezisin azaldığını ve apoptotik hücrelerin sayısında artış olduğunu bildirirken, Panahi ve ark. (138) bir transkripsiyon faktörü olan Nuclear Factor kappa B (NF- κ B) üzerine curcuminin anjiogenezis etkilerine bakmışlar ve sonuç olarak curcuminin anjiogenezisi azalttığını belirtmişlerdir. El Azab ve ark. (22) yapmış oldukları çalışmada EAT hücresi verilmiş farelerde curcumin ve resveratrolün anti anjiogenik etkisine bakmışlar ve çalışmalarında curcumin ve resveratrolün mikro damarlanmayı baskıladığını belirtmişlerdir.

Sunulan çalışmada kontrol ve tedavi gruplarında oluşturulan tümör dokularından alınan kesitlerde F8 ekspresyonunun belirlenmesi için immünohistokimyasal boyama prosedürü uygulandı ve mikrodamarlanmanın solid tümörün gelişimi ile bağlantısını araştırıldı. Tüm tümör kitlelerinde F8'in ekspresyon yoğunluğunun nekrotik alanlarda

oldukça az, perifer bölgelerde nispeten fazla olduğu görüldü. Damar yoğunluğundaki bu farklılık, hızlı proliferere olma özelliğine sahip olan Ehrlich tümörlerinde damarlanmanın tümör büyüme oranı ile aynı hızda olmaması, tümör dokusundaki bölgesel farklılıkların ve buna bağlı olarak nekrotik alanların oluşma gerekçesini açıklayabilir. Çalışmamızda tümör dokusuna ait nekrotik bölgeler değerlendirmeye alınmadı. Gruplar arasındaki damar yoğunluğuna bakıldığında kontrol grubunda ortalama damar yoğunluğu 6.033 olarak hesaplanırken, tedavi gruplarından 25mg/kg curcumin uygulanan grupta ortalama damar yoğunluğu 3.000, 50mg/kg curcumin uygulanan grupta ise 1.866 olarak hesaplandı. Gruplar arasındaki F8 ekspresyon yoğunluğu açısından tedavi gruplarındaki azalma kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p < 0.05$). Sonuçlarımız diğer çalışmalarda olduğu gibi curcuminin anjiogenezisi önlediği doğrultusundadır.

In vitro olarak curcumin ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok curcuminin IC_{50} değerini belirlemek üzerine yapılmış çalışmalardır. Agrawall ve ark. (139) çalışmalarında *Brucine*'nin EAT hücreleri üzerine antitümöral etkisini araştırmışlar ve 96'lık plate'lere ekilen 1×10^6 EAT hücresinde curcumin tedavisi sonrası IC_{50} değerine $20 \mu M$ curcumin dozunda ulaştıklarını belirtmişlerdir Odot ve ark. (127) melanom hücreleri üzerine curcuminin antitümöral etkisini araştırmışlar ve B16R melanom hücreleri üzerine $50 \mu M$ curcuminin 24 ve 36. saatlerde IC_{50} (maksimum inhibisyonun % 50'sini oluşturan ilaç konsantrasyonu) değerine ulaştığını ve denenen $27 \mu M$ ve $18 \mu M$ curcuminin de B16R melanom hücreleri üzerine toksik etki gösterdiğini belirtmişlerdir. Abuelba ve ark. (140) yapmış oldukları curcuminin göğüs adenokarsinomu üzerine etkilerine MDA-MB-231 hücre hattında çalışmışlar ve 48 saatlik inkübasyondan sonra $15 \mu M$ curcumin'in tümör hücresi gelişimini baskıladığını ve curcumin'in apoptozu artırdığını rapor etmişlerdir. Gayatri ve ark. (141) EAT hücreleri üzerine *Sphaeranthus amaranthoides* bitkisinin *in vitro* olarak çalışmışlardır. $15 \mu M$ tedavi uyguladıkları grupta EAT hücre hattında %82 civarında hücrelerin baskılandığını ve tedavinin hücre hattında azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir Ceylan (118) EAT hücre hattında gilaburu (*Viburnum opulus*) meyve suyunun ekstresinin etkilerini araştırmış ve IC_{50} değeri $250 \mu g ml^{-1}$ olarak bulunmuştur. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada 96 kuyucuklu plate'lere kontrol ve deney gruplarında eşit olacak şekilde hazırlanan EAT hücre süspansiyonundan $50 \mu l$ alarak ekim işlemini yapıldı. Her bir kuyucukta $160 \mu l$ medium içerisinde 104000 hücre olacak şekilde ayarlanan hücre hattının üzerine $10 \mu g/ml$, $20 \mu g/ml$ ve $30 \mu g/ml$ oranında curcumin ekleyerek inkübatörde 3 saat ve 24

saat bekletildikten sonra thoma lamında tekrardan canlı ve ölü hücreler sayıldı. Sayma işlemini ölü ve canlı hücreler üzerinde iki ayrı kişi tarafından yapıldı. İki ayrı kişinin yapmış olduğu sayımlar 3 saatlik ve 24 saatlik canlı hücrelerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur $p < 0.05$. 3 saatlik ve 24 saatlik sonuçlarda tedavi gruplarında $10\mu\text{g/ml}$ curcumin verilen gruplarda ölü hücrelerin ortalama sayısının daha fazla olduğu görülmüştür.

Çalışmamızda *in vivo* ve *in vitro* gelişen tümörlere örnek olması açısından EAT hücreleri kullanıldı. Intraperitoneal ve subkutan enjeksiyon ile oluşturduğumuz Ehrlich assit ve solid tümör dokusunda yaptığımız incelemeler sonucunda, *in vivo* olarak assit tümör oluşturulan gruplarda dokulara ait histopatolojik sonuçlarda 50mg/kg curcumin uyguladığımız tedavi grubuna ait dokularda EAT hücre tutulumunun diğer tedavi grubuna ve kontrol grubuna oranla daha az olduğunu gözlemledik. Deney sonrasında hayvanlardan aldığımız sıvılarda EAT hücrelerini saydığımızda 50mg/kg curcumin uygulanan grupta EAT hücre sayısının azalmış olduğunu gördük. Subkutan uygulama gruplarında tümör hacmi ölçümünde 25mg/kg curcumin uygulanan grupta diğer tedavi grubu 50mg/kg curcumin'e oranla tümör hacminin daha da azalmış olduğunu belirledik. Apoptozun 50mg/kg curcumin uygulanan grupta arttığını anjiogenezisin ise bu grupta azaldığını deneyler sonrasında kaydettik. *In vitro* deneylerde ise EAT hücreleri üzerine eklenen curcuminin ($10\mu\text{g/ml}$) hücre ölümünü artırdığını belirledik. Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara bakarak curcumin'in EAT hücrelerinin baskılanmasında etkin olduğunu söyleyebiliriz.

Bu çalışmanın curcumin ile ilgili olarak yapılacak diğer *in vivo* ve *in vitro* çalışmalarda curcumin dozları hakkında yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.

6.KAYNAKLAR

- 1 Çetin A. Kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Bitirme Ödevi. 2013;25-27.
- 2- Merlo LM, Pepper JW, Reid, B.J. Cancer as an evolutionary and ecological process. *Nature Reviews Cancer* 2006;6: 924-935.
- 3 -<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/>) Erişim tarihi 22.11.2015 20:08
- 4- Gültekin M, Boztaş G. Meme kanseri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Daire Başkanlığı 2014;12-28.
- 5- Kayaalp SO. Tıbbi Farmakoloji, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara,1996;731-79,
- 6- Weiss RB, Henney JE, DeVita VT. Multimodal treatment of primary breast carcinoma. analysis of accomplishments and problem areas. *The American Journal of Medicine*, 1981;70:844-851.
- 7- Çevik Ö, Aydın U, Gürsoy M. Kanser tedavisinde lenfatik hedeflendirme. *Hacettepe üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi*. 2012;32:67-90.
- 8- Akpolat M, Tarladaçalışır YT, Uz YH, Metin MS, Kızılay G. Kanser tedavisinde curcuminin yeri. *Yeni Tıp Dergisi* 2010;27:142-147.
- 9- Kocaadam B, Şanlıer N. Curcumin, an active component of turmeric (*curcuma longa*), and Its effects on health. *Crit Rev Food Sci Nutr* 2015;3:123-127.
- 10- Hatcher H, Planalp R, Cho J, Torti FM. Curcumin from ancient medicine to current clinical trials. *Cell Moll Life* 2008;65:1631-1652.
- 11- Gevorkyan L, Gambashidze K. Anticancer efficacy of hydroxyethylthiamine diphosphate in vivo. *Exp Oncol*. 2014;36:48-49.

- 12- Ozaslan M, Karagoz I, Kilic I, Güldür M. Ehrlich ascites carcinoma. *African Journal of Biotechnology* 2011;10:2375-2378.
- 13- Kaleođlu Ö, İřli N. Ehrlich asit tümörü. *Tıp Fakóltesi Mecmuası*. 1977;40978-984.
- 14- Kürkçü E. Deneysel olarak oluşturulmuş meme tümörlerinde curcuminin arginaz enzim aktivitesi, ornitin ve nitrik oksit düzeylerine etkisi. *Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi*. 2008;29-34.
- 15- Berrington D, Lall N. Anticancer activity of certain herbs and spices on the cervical epithelial carcinoma cell line. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine* 2012;11-13.
- 16- Abdullaev F. Plant-driven agents against cancer. *Pharmacology And Therapeutics In The New Millennium*. Narosa Puplicing House, New Delhi, India 2001;345-348.
- 17- Atıcı E. Tıp tarihinde kanser ve lösemi. *Türk Onkoloji Dergisi* 2007;22:197-204.
- 18- Mızrak D, Akbulut H. Kanser hastası ve açlık. *Türk Onkoloji Dergisi* 2015;30:152-157.
- 19- Suffiness M, Douros J. Drugs of plant origin. *Cancer Drug Development* 1982;26:73-126.
- 20- Surh YJ. Cancer chemoprevention with dietary phytochemicals. *Nat Rev Cancer* 2003;3:768-80.
- 21- Tozkoparan B, Aytaç SP, Kanser kemoterapisinde terapötik hedef olarak glutatyon S-transferazlar. *Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakóltesi Dergisi* 2007;27:139-164.
- 22- Azab ME, Hishe H, Moustapha Y, Awady ES. Anti-angiogenic effect of resveratrol or curcumin in ehrlich ascites carcinoma-bearing mice. 2011;652:7-14.
- 23- Thakam A, Saewan N. Antioxidant activities of curcumin-metal complex. *Thai Journal of Agricultural Science* 2011;44:188-193.
- 24- <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/>) Eriřim tarihi 26-01-15 22:45
- 25- Kolutek R, Avcı İA. The effect of training and monitoring at home on the knowledge level and practices of married women regarding breast and cervical cancer. *J Breast Health* 2015;11:155-62.

- 26- Folkman J, Shing Y. Angiogenesis. *The Journal of Biological Chemistry* 1992;267:10931-10934.
- 27- Zhu Y, Warin RF, Soroka DN, Chen H, Sang S. Metabolites of ginger component shogaol remain bioactive in cancer cells and have low toxicity in normal cells. *Chemical Synthesis and Biological Evaluation* 2013;8:1-13.
- 28- Aydınтуğ S. Meme kanserinde erken tanı. *Sted* 2004;13:226-228.
- 29- <http://slideplayer.biz.tr/slide/2961072/#> Erişim tarihi 01-01-2016 16:30.
- 30- Ghosh S, Bhattacharryya S, Rashid K, Sil PC. Curcumin protects rat liver from streptozotocin-induced diabetic pathophysiology by counteracting reactive oxygen species and inhibiting the activation of p53 and mapks mediated stress response pathways. *Toxicology Reports* 2015;2:365-376.
- 31- Bonadonna G, Does chemotherapy fulfill its expectations in cancer treatment?. *Annals of Oncology*, 1990;1:11-21.
- 32- Robert A, Saslow D et al. American cancer society guidelines for breast cancer. 2003;53:141-169.
- 33- Scartezzini P, Speroni E. Review on some plants of indian traditional medicine with antioxidant activity. *Ethno Pharmacol* 2000;71:23-43.
- 34- Işık M. Akçay F. Kanser tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp. *Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics* 2014;5:28-36.
- 35- Ali T, Shakir F, Morton J. Curcumin and inflammatory bowel disease. *Biological Mechanisms and Clinical Implication. Digestion* 2012;85:249–255.
- 36- Cao F, Liu T, Xu Y et al. Curcumin inhibits cell proliferation and promotes apoptosis in human osteoclastoma cell through MMP-9, NF-κB and JNK signaling pathways. *Int J Clin Exp Pathol.* 2015;8:6037–6045.
- 37- Rashid K, Sil PC. Curcumin enhances recovery of pancreatic islets from cellular stress induced inflammation and apoptosis in diabetic rats. *Toxicology and Applied Pharmacology* 2015;287:297-310.
- 38- Huang MT, Newmark HL, Frenkel K. Inhibitory effect of curcumin on tumorigenesis in mice. *Journal of Biochemistry Supplement* 1997;27:26-34.
- 39- Maheshwari RK, Singh AK, Gaddipati J, Srimal RC. Multiple biological activities of curcumin: A short review. *Life science* 2006;78:2081-2087.

- 40- Mahady G. B, Pendland, S. L, Yun, G; Lu, Z. Z. Turmeric(*Curcuma longa*) and curcumin inhibit the growth of *helicobacterpylori*, a group 1 carcinogen. *Anticancer Res* 2002;22:4179–81.
- 41- <https://natashadh.wordpress.com/2014/03/21/turmeric-natures-pharmacy/> Erişim tarihi 26-02-2016 09:30
- 42- Kheradpezhoh E, Barritt GJ, Rychkov GY. Curcumin inhibits activation of TRPM2 channels in rat hepatocytes. *Redox Biology* 2015;7:1-7.
- 43- Sharma RA, Gescher AJ, Steward WP. Curcumin: the story so far. *Eur J Cancer* 2005;43:1955-1968.
- 44- Pan MH, Huang TM, Lin JK. Biotransformation of curcumin through reduction and glucuronidation in mice. *Drug Metab Dispos* 1999;27:486-494.
- 45- Kim CY, Le TT, Chen C, Cheng CX et al. Curcumin inhibits adipocyte differentiation through modulation of mitotic clonal expansion. *The Journal of Nutritional Biochemistry* 2011;22:910-920.
- 46- Deshpande SS, Ingle AD. and Maru GB. Inhibitory effects of curcumin free aqueous turmeric extract on benzo[a]pyrene-induced forestomach papillomas in mice. *Cancer Letters* 1997;118:79–85
- 47- Azuine MA, Bhide SV. Chemopreventive effect of turmeric against stomach and skin tumors induced by chemical carcinogens in Swiss mice. *Nutrition and Cancer* 1992;17:77–83
- 48- Chan MM. Inhibition of tumor necrosis factor by curcumin, phytochemical. *Biochemical Pharmacology* 1995;49:1551–1556.
- 49- Chen HW, Huang HC. Effect of curcumin on cell cycle progression and apoptosis in vascular smooth muscle cells. *British Journal of Pharmacology* 1998;124:1029–1040.
- 50- Ammon HP, Wahl MA. Pharmacology of *curcuma longa*. *Planta Medica* 1991;57:1–7.
- 51- Limtrakul P, Lipigorngoson S, Namwong O, Apisariyakul A, Dunn FW. Inhibitory effect of dietary curcumin on skin carcinogenesis in mice. *Cancer Lett* 1997;116:197-203.
- 52- Kuttan R, Sudheeran PC, Joseph CD. Turmeric and curcumin as topical agents in cancer therapy. *Tumori* 1987;73:29-31.

- 53- Kohli K, Ali J, Ansari MJ, Raheman Z. Curcumin a antiinflammatory agent. *Indian J Pharmacol.* 2005;37:141-147.
- 54- Anto RJ, Mukhopadhyay A, Denning K, Aggarwal BB. Curcumin (diferuloylmethane) induces apoptosis through activation of caspase-8, BID cleavage and cytochrome c release: its suppression by ectopic expression of Bcl-2 and Bcl-xl. *Carcinogenesis* 2002;23:143-50.
- 55- Piper JT, Singhal SS, Salameh MS, Torman RT, Awasthi YC, Awasthi S. Mechanisms of anticarcinogenic properties of curcumin the effect of curcumin on glutathione linked detoxification enzymes in rat liver. *Int J Biochem Cell Biol* 1998;30: 445-56.
- 56- Bhaumik S. Anjum R, Rangaraj N, Pardhasaradhi BV, Khar A. Curcumin mediated apoptosis in AK-5 tumor cells involves the production of reactive oxygen intermediates. *FEBS Lett* 1999;456:311-314.
- 57- Zeybek Ü. Kanser arařtırmaları ve deneysel modeller. *Deneysel Tıp Arařtırma Enstitüsü Dergisi* 2013;3:187-198.
- 58- Fantozzi A. Mouse models of breast cancer metastasis. *Breast Cancer Research* 2006;8:1-11.
- 59- Aktař, E. Ehrlich asit sıvısının L-hücrelerinin çoęalma hızına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul 1996;18-21.
- 60- Ehrlich P. Apolant H. Beobachtungen uber maligne mausentumoren. *Berlin Klin Wochenschr* 1905;42:871-874.
- 61-Tařkın Eİ. Ehrlich Ascites Tümörü ile Balb/c ırkı farelerde oluşturulmuş solid tümör modelinde curcuminin apoptoz üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2002;16-28.
- 62- Lazebnik YA, Medveda DN, Zenin VV. Reversible G2 block in the cell cycle of ehrlich ascites carcinoma cells. *Experimental Cell Research* 1991;195:247-254.
- 63- Gümüřhan H. i.p., i.v., s.c., yollarla uygulanan adriamycin'in Ehrlich Asit Tümörü (EAT) taşıyan farelere etkileri üzerine bir çalıřma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, řanlıurfa 2002;28-31.
- 64- Siems WG, Grune T, Schmidt H Tikhonov YV, Pimenov MA. Purine nucleotide levels in host tissues of Ehrlich Ascites Tumor bearing mice in different growth phases of the tumor. *Cancer Research* 1993;53:5143-5147.

- 65- Öner D. Ehrlich Ascites Tümör hücrelerinde vincristin'e karşı duyarlılığın tümör yaşı ile ilikisi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Radyoloji ve Sağlık Fizyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 1985;36-38.
- 66- Altun S. Normal, tümoral ve rejeneratif büyümeler arasındaki kinetik ilişkiler. Traditional Journal of Biology. Tübitak 1996;20:153-173.
- 67- Baillif RN. The solid phase of the ehrlich ascites tumor in mice. Cancer Research 1954;14:554-558.
- 68- Fecchio D, Sirois P, Russo M, Jancar S. Studies on inflammatory response induced by Ehrlich tumor in mice peritoneal cavity. Inflammation 1990;14:125-131.
- 69- Pamir A. Tıbbi Onkoloji Kitabı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları 2005;145-148.
- 70- Searle J, Kerr JF, Bishop CJ. Necrosis and apoptosis distinct modes death with fundamentally different significance. Pathol Annu 1982;17:229-259.
- 71- Cohen JJ. Programmed cell death and apoptosis in lymphocyte development and function. American College of Physicians Chest 1993;103:99-101.
- 72- Öktem S, Özhan MH, Özol D. Apoptozin önemi Toraks Dergisi 2001;(1):91-95.
- 73- Simon HU, Haj YA, Levi-Schaffer F. Role of reactive oxygen species (ROS) in apoptosis induction Apoptosis 2000;5:415-418.
- 74- Ogata Y, Takahashi M. Bcl-xas an Antiapoptotic Molecule for Cardiomyocytes Drug News Perspect 2003;16:446-52.
- 75- Gil J, Yamamoto H, Zapata JM, Reed JC, Perucho M Impairment of the proapoptotic activity of Bax by missense mutations found in gastrointestinal cancers. Cancer Res 1999;59:2034-2037.
- 76- Turgut B, Demir T, Celiker Ü. Oftalmolojide Apoptoz. Fırat Tıp Dergisi 2006;11:6-11.
- 77- Apoptoz ders notları, Erişim: http://biyokimya.uludag.edu.tr/apoptoz_ders_notu (11-12-2015 20:00).
- 78- Cohen JJ, Duke RC. Apoptosis and programmed cell death in Immunity. Annu Rev Immunol 1992;10:267-293.
- 79- Hsueh AJW, Eisenhauer K, Chun S, Hsu S, Billig H. Gonadal cell apoptosis. Recent Progress in Hormone Research 1996;51:432-457.

- 80- <http://medicinembbs.blogspot.com.tr/2011/03/programmed-cell-death-apoptosis.html> Erişim tarihi 12-12-2015 17:00.
- 81- <https://www.quora.com/What-role-does-apoptosis-play-in-metamorphosis>.Erişim tarihi 12-12-2015 18:00.
- 82- Mis L, Yeltekin AÇ. Review: Apoptozis. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 2014;3:102-112.
- 83- Elmore S. Apoptosis a review of programmed cell death.-Toxicol Pathol. 2007;35:495-516.
- 84- Searle J, Kerr JF, R, Bishop CJ. Necrosis and apoptosis. Pathology Annual 1982;17:229-59.
- 85- Thompson CB. Apoptosis in the pathogenesis of autoimmune disease. Clin Immunol Immunopathol 1995;267:1456-1462.
- 86- Narula J, Kharbanda S, Khaw B A. Apoptosis and the heart. Chest 1997;112:1358-62.
- 87- Bulan Ö. Ehrlich Ascites Tümör hücrelerinde yaşlanma ile hücre kinetiği arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 1990;58-60.
- 88- Kaymak E. Ehrlich solid tümörlerinde netrin 1 ve faktör 8 ekspresyonu üzerine paklitaksel'in etkisinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2015;58-60.
- 89- Folkman J. Tumor angiogenesis. Adv Cancer Res 1985;43:175-203.
- 90- Abulafia O, Triest WE, Sherer DM, Hansen CC, Ghezzi F. Angiogenesis in endometrial hyperplasia and stage endometrial carcinoma. Obstet Gynecol 1995;86:479-85.
- 91- Folkman J. What is the evidence that tumors are angiogenesis dependent? Natl Cancer Inst 1990;82:4-6.
- 92- Velasco P, Lange-Asschenfeldt B. Dermatological aspects of angiogenesis. British Journal of Dermatology 2002;147:841-52.
- 93- Ertekin T. Farelerde deneysel olarak oluşturulan kolon kanseri üzerine angiostatın'ın etkileri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 2008;22-25.

- 94-Beecken WD, Engl T, Jonas D, Blaheta RA. Expression of angiogenesis inhibitors in human bladder cancer may explain rapid metastatic progression after radical cystectomy. *Int J Mol Med* 2009;23:261-66.
- 95- Albo D, Granick MS, Jhala N, Atkinson B, Solomon MP. The relationship of angiogenesis to biological activity in human squamous cell carcinomas of the head and neck. *Ann Plas Surg* 1994;32:588-94.
- 96- Shimizu K, Oku N. Cancer anti-angiogenic therapy. *Biological Pharmaceutical Bulletin* 2004; 27:599-605.
- 97- Vukanovic J, Isaacs JT. Linomide inhibits angiogenesis, growth, metastasis, and macrophage infiltration with in rat prostatic cancers. *Cancer Research* 1995;55:1499-1504.
- 98- Hu DE, Fan TPD. Suppression of VEGF-induced angiogenesis by the protein tyrosine kinase inhibitor, lavendustin A. *British Journal of Pharmacology* 1995;114:262-268.
- 99- Guidi AJ, Fischer L, Harris JR, Schnitt SJ. Microvessel density and distribution in ductal carcinoma in situ of the breast. *JNCI* 1994;86:614-619.
- 100- Weidner N, Semole JP, Welch WR, Folkman J. Tumor angiogenesis correlates with metastasis in invasive breast carcinoma. *N Engl J Med* 1991;324:1-8.
- 101-Reilly M, Boehm T, Shing Y et al. Endostatin: An endogenous inhibitor of angiogenesis and tumor growth *Cell* 1997;88:277-285.
- 102-Jemal A, Murray T, Samuels A, Ghafoor A, Ward E, Thun MJ. Cancer statistics . *CA Cancer J Clin* 2003;53:5-26.
- 103-Greenlee RT, Harmon MB, Murray T, Thun M. Cancer statistics. *Cancer J Clin* 2001;51:15-36.
- 104-Kızılcı S. Kemoterapi alan kanserli hastalar ve yakınlarının yaşam kalitesini etkileyen faktörler. *C Ü Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi* 1999;3:18-26.
- 105-Özkan S. Psiko-Onkoloji. İstanbul:Form Reklam Hizmetleri 2007;104-106.
- 106-Raju A,Christina MJA, Murali A Antitumor activity of ethanol and aqueous extracts of *Drosera Burmannii* vahl. In EAC Bearing Mice. *Spatula DD* 2012;2:83-88.
- 107- Limtrakul P, Lipigorngoson S, Namwong O, Apisariyakul A, Dunn FW. Inhibitory effect of dietary curcuminon skin carcinogenesis in mice. *Cancer Lett* 1997;116:197-203.

- 108- Priyadarsini KI. Free radical reactions of curcumin in membrane models. *Free Radic Biol Med* 1997;23:838-843.
- 109-Ushida J, Sugie S, Kawabata K, Pham QV, Tanaka T, Fujii K, et al. Chemopreventive effect of curcumin on N-nitrosomethylbenzylamine induced esophageal carcinogenesis in rats. *Jpn J Cancer Res* 2000;91:893-898.
- 110-Kanter P, Tarladaçalışır YT, Akpolat M, Mercantepe T. Gamma radyasyona bağlı oluşan jejunum mukoza hasarına karşı curcumin ve amifostinin koruyucu etkilerinin incelenmesi. *Tıp araştırmaları dergisi* 2008;6(3):128-135.
- 111-Lopez LM Anticancer and carcinogenic properties of curcumin. Considerations for its clinical development as a cancer chemopreventive and chemotherapeutic agent. *Mol. Nutr. Food Res* 2008;52:103–127.
- 112-Pan HM, Huang TM, Lin JK. Biotransformation of curcumin through reduction and glucuronidation in mice. *The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics* 1998;27:486-493.
- 113-Yu GW, Xu G, Ren JG, et al. Preventive Action of Curcumin in Experimental Acute pancreatitis in mouse. *Indian J Med Res* 2011;134:717-724.
- 114-Ueki M, Ueno M, Morishita J, Maekawa N. Curcumin ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity by inhibiting renal inflammation in mice. *Journal of Bioscience and Bioengineering* 2013;115:547-551.
- 115-Aktas C, Kanter M, Kocak Z. Antiapoptotic and proliferative activity of curcumin on ovarian follicles in mice exposed to whole body ionizing radiation. *Toxicology and Industrial Health* 2011;1:12-15.
- 116-Srimal RC, Khanna NM, Dhavan BN. A Preliminary Report on Anti Inflammatory Activity of Curcumin. *Int J Pharm* 1971;3:110-115.
- 117-Zunino SJ, Storms DH, Newman JW, Pedersen TL, Keen CL, Ducore JM. Oral or parenteral administration of curcumin does not prevent the growth of high risk acute lymphoblastic leukemia cells engrafted into a NOD/SCID mouse model. *International Journal of oncology* 2013;42:741-748.
- 118-Ceylan D. Farelerde deneysel olarak oluşturulan kanser üzerine gilaburu (vıburnum opulus) meyve suyunun etkileri. Erciyes üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. 2015;58-65.
- 119-Facchini JM, Alves EP, Aguilera C, Gern RMM, Silveira MLL, Elisabeth W, Furlan SA. Antitumor activity of pleurotus ostreatus polysaccharide fractions on

- ehrllich tumor and sarcoma. *International Journal of Biological Macromolecules* 2014;68:72-77.
- 120-Hanafy ZE, Ginger extract antimutagens as cancer chemopreventive agent against ehrllich ascites carcinoma. *Academic Journal of Cancer Research* 2009;2:61-67.
- 121-Patra S, Muthuraman MS, Prabhu AR, Priyadharshini RR, Parthiban S. Evaluation of antitumor and antioxidant activity of sargassum tenerrimum against ehlich ascites carcinoma in mice. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention* 2015;16:915-921.
- 122-Özaslan M, Karagöz D, Kalender ME, Kılıç H. In vivo antitumoral effect of plantago majorl. extract on balb/c mouse with ehrllich ascites tumor. *The American journal of Chinese Medicine* 2007;35:841-851.
- 123-Joseph MM, et all. Antitumor activity of galactoxyloglucan-gold nanoparticles against murine ascites and solid carcinoma colloids and surfaces b. biointerfaces. *Journal of Cancer Prevention* 2014;116:219–227.
- 124-Ekinci G. Katı Ehrlich ascites tümörünün büyüme kinetiği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2000;22-27.
- 125-Önder GÖ. Ehrlich solid tümörlerinde kanser kök hücre varlığının immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi Kayseri. 2015;52-53.
- 126-Choudhuri T, Pal S, Agwarwal ML, Das T, Sa G. curcumin induces apoptosis in human breast cancer cells through p53-dependent Bax induction. *Febs Letters* 2002;512:334-340.
- 127.Odot J, Albert P, Carlier A , Tarpın M, Devy J, Madoulet C. In vitro and in vivo anti-tumoral effect of curcumin against melanoma cells *Int J. Cancer* 2004;111:381–387.
- 128-Somasundaram S, Endmund NA et all. Dietary curcumin inhibits chemotherapy-induced apoptosis in models of human breast cancer. *Cancer Res* 2002;62:3868-3870.
- 129-Weir NM, Selvendiran K, Kutula VK, et all. Curcumin induces G2/M arrest and apoptosis in cisplatin-resistant human ovariana cancer cells by modulating akt and p53 mAPK. *Cancer Biology and Therapy* 2007;6:178-184.

- 130-Armutak EI, Gültekin M. Effect of on apoptosis in vivo solid ehrlich ascites tumor model in Balb-C mice. *İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi* 2014;40:183-190.
- 131-Pal S, Choudhuri T, Chattopadhyay S et al. Mechanisms of curcumin induced apoptosis of ehrlich's ascites carcinoma cells. *Biochemical and Biophysical Research Communication* 2001;288:658-665.
- 132-Kajdaniuk D, Marek B, Foltyn W, Kos-Kudła B. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) -Part 1: In Physiology and Pathophysiology. *Endokrynol Pol* 2011;62:444-455.
- 133-Hlatky L, Hahnfeldt P, Folkman J. Clinical Application of Antiangiogenic Therapy: Microvessel Density, What it Does and Doesn't Tell Us. *J Natl Cancer Inst* 2002; 94:883–893.
- 134- Delisser HM. Involvement of endothelial PECAM-1/CD31 in angiogenesis. *Am J Pathol* 1997;151:671-677.
- 135-Geng Y, Wang J, Jing H, H.W, Bao Y X. Inhibitory effect of dexamethasone on lewis mice lung cancer cells. *Genet. Mol. Res* 2014;13:6827-6836.
- 136-Perassi BV, Arbab AS, Ferreira LC, Borin TF, Varma NRS, et al. Effect of melatonin on tumor growth and angiogenesis in xenograft model of breast cancer. *Cancer Ins* 2014;9:236-239.
- 137-Fu Z, Chen X, Guan S, Yan Y, Lin H, Hua ZC. Curcumin inhibits angiogenesis and improves defective hematopoiesis induced by tumor-derived vegf in tumor model through modulating vegf-vegfr2 signaling pathway. *Oncotarget* 2015;14:6:19469–19482.
- 138-Panahi Y, Darvishi B, Ghanei M, Jowzi N, Beiraghdar F, Varnamkhasti BS. Molecular mechanisms of curcumins suppressing effects on tumorigenesis, angiogenesis and metastasis, focusing on nf- κ b pathway. cytokine growth factor. *Rev Pharmacognosy Research* 2015;15:1359-71.
- 139-Agrawal SS, Saraswati S, Mathur R, Pandey M. Cytotoxic and antitumor effects of brucine on Ehrlich ascites tumor and human cancer cell line. *Life Sciences* 2011;89:147-158.
- 140-Abuelba H, Cotrutz CE, Stoica BA, Stoica L, Olmici D, Petreuş T. In vitro evaluatio of curemin effect on breast adenocarcinoma 2D and 3D cell cultures. *Rom J. Morphol Embryol* 2015;56:71-76.

141-Gayatri S, Reddy CUM, Chitra K, Parthasarathy V. Assessment of in vitro cytotoxicity and in vivo antitumor activity of sphaeranthus amaranthoides burm. Pharmacognosy Research 2015;7:198-202.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ YEREL KURUL BAŞKANLIĞI
KAYSERİ-TÜRKİYE

ETİK KURULUN ADI: Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

ETİK KURULUN ADRESİ: Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM)

Tarih:12.02.2014

Toplantı Sayısı: 02

Karar No:14/029

Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu **12.02.2014** tarihinde **Prof. Dr. Harun ÜLGER**'in başkanlığında toplanmıştır.

Üye Adı/Soyadı	Unvanı	Bölümü	İmza
Harun ÜLGER	Prof. Dr.	Tıp Fak.
Abdullah İNCİ	Prof. Dr.	Veteriner Fak.
Özlem CANÖZ	Prof. Dr.	Tıp Fak.
Fusun Ferda ERDOĞAN	Prof. Dr.	Tıp Fak.
Coşkun TEZ	Prof. Dr.	Fen Fak.
Betül AYCAN	Doç. Dr.	Eczacılık Fak.	Katılmadı
Ahmet ÖZTÜRK	Doç. Dr.	Tıp Fak.
Gökçen Yuvalı ÇELİK	Doç. Dr.	Eczacılık Fak.
Servet KESİM	Yrd. Doç. Dr.	Diş Hekimliği Fak.	Katılmadı
Gökçen DİNÇ	Dr.	DEKAM
Serap ALTUNDAŞ EROĞLU	Av.	Kurumla İlişkisi Olmayan Üye	Katılmadı
Asiye GÖKBELEN	Yardımcı Doç. Dr.	Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi	Katılmadı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden **Doç Dr Niyazi ACER** tarafından sunulan “**Curcumin'in ehrlich assit ve solid tümör oluşturulan farelerde antitümöral etkisinin araştırılması**” adlı araştırma projesi incelenerek çalışmanın yapılmasının uygun olacağına ve Rektörlük makamına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Tarih : 12.05.2014

Etik kurul Başkanı : Prof. Dr. Harun ÜLGER

İmzası :

KARAR SİPA NO	KARARA ESAS OLAN ETKİNLİK		GÖNEREN
	TARİHİ	NO	
238	03.02.2014		
Toplantı Tarihi: 03.02.2014			Doktora Öğrencisi Seher YILMAZ'ın Tez Proj
Başkan: Prof. Dr. Harun ÜLGER			
Üyeler: Prof. Dr. Erdem UNUR			
Prof. Dr. Kenan AYCAN			
Doç. Dr. Niyazi ACER			
Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKİN			
Yrd. Doç. Dr. Mehtap NISARI			KARAR

Anabilim dalımız doktora öğrencisi Seher YILMAZ hazırladığı doktora tez projesi "Curcumin'in, Ehtelch Assit ve Solid Tümör Oluşturulan Fareler Antitümöral Etkisinin Araştırılması" isimli tez konusunu akademik kurulunda görüşülmüş araştırmanın yapılması uygun görülmüştür.

Prof. Dr. Harun ÜLGER
İmza

Prof. Dr. Kenan AYCAN
İmza

Prof. Dr. Erdem UNUR
İmza

Doç. Dr. Niyazi ACER
İmza

Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
İmza

Yrd. Doç. Dr. Mehtap NISARI
İmza

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Seher YILMAZ

Uyruđu :Türkiye (TC)

Doğum Tarihi : 17-04-1980

Doğum Yeri :KAYSERİ

Medeni Hali :Bekar

Tel: 0536 344 67 63

Adres: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı.

E-Posta: sehery38@hotmail.com, seher.yilmaz@kapadokya.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ:

2004 :Erciyes üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2010 :Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalıYükseklisans programı

Yabancı Diller :İngilizce Üds not 62.750

DENEYİMLER :

2004-2014 Erciyes üniversitesi tıp fakültesi hastanesi hemşire

2014-2016 Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi